



کنکور آسان است
KONKURSARA

 /konkursara

 @konkursara_official

021-55756500
www.konkursara.com



نام درس: فیزیک
تاریخ امتحان: ۹۶/۰۳/۰۶
ساعت امتحان: ۸:۰۰
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
مدیریت منطقه ۲
دبیرستان دوره دوم پسرانه **سرکارتی** سعادت آباد
سوالات امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

نام و نام خانوادگی:
پایه و رشته: دهم تجربی
شماره داوطلب:

محل مهر و امضاء مدیر	نمره به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:	نمره به حروف:
	نام دبیر: امیرعباس یاری	تاریخ و امضاء:	نام دبیر: امیرعباس یاری	تاریخ و امضاء:
ردیف	سوالات	بارم		

۲	<p>هریک از کمیت های داده شده را با ذکر واحد آن در SI بیان کنید:</p> <p>الف) چگالی: ب) ظرفیت گرمایی ویژه: ج) انرژی مکانیکی: د) نیروی ارشمیدس:</p>	۱
۱	<p>پاسخ دهید:</p> <p>الف) منظور از دقت اندازه گیری چیست؟ ب) اگر دمای محیط توسط یک دماسنج رقمی $24/5^{\circ}\text{C}$ اندازه گیری شود، مقادیر دقت و خطای اندازه گیری را بر حسب درجه سانتی گراد بیان کنید.</p>	۲
۱,۵	<p>در شکل داده شده جسم تحت تاثیر نیروی F از حالت سکون شروع به حرکت می کند. اگر مقاومت مسیر برابر $(f_k = 4\text{N})$ باشد، سرعت جسم پس از 6m جابجایی چند متر بر ثانیه است؟</p> 	۳
۱	<p>جسمی به جرم 5Kg از ارتفاع 20m نسبت به سطح زمین رها می شود. اگر مقاومت مسیر ناچیز باشد، سرعت جسم در لحظه ی برخورد با زمین چند m/s است؟ $g \approx 10 \text{ m/s}^2$</p>	۴
۱	<p>جاهای خالی را کامل کنید:</p> <p>الف) $4 \times 10^5 \text{ Kw} = \dots \text{ Mw}$ ب) $5 \times 10^{-4} \mu\text{m}^2 = \dots \text{ nm}^2$</p>	۵
۱,۵	<p>منظور از ضریب انبساط خطی چیست؟ اگر این کمیت برای یک فلز $5 \times 10^{-5} / ^{\circ}\text{C}$ باشد، افزایش حجم 40 cm^3 از این فلز به ازای 200°C افزایش دما، چند سانتی متر مکعب خواهد بود؟</p>	۶
۱,۵	<p>الف) دمای یک جسم را تعریف کنید؟ ب) اگر دمای یک جسم 50°C درجه فارنهایت باشد، دمای آن چند درجه کلوین است؟</p>	۷
۱,۵	<p>اثر موینگی را با آب و جیوه با ذکر علت و بیان نتیجه مختصراً شرح دهید (با رسم شکل).</p>	۸
۱,۵	<p>در یک ظرف عایق 100 گرم آب 60°C موجود است. چند گرم آب 20°C به این ظرف اضافه نمائیم تا دمای تعادل برابر 40°C گردد. $C_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{Kg}^{\circ}\text{C}}$</p>	۹
۱,۵	<p>اصل برنولی را بیان کنید. اگر جریان پایای آب با سرعت $5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از مقطع لوله با شعاع 20 cm وارد شود، سرعت خروج آب از مقطع دیگر با شعاع 10 cm را بیابید.</p>	۱۰

۱,۵	<p>با توجه به نمودار فشار - حجم داده شده پاسخ دهید: الف) نوع فرآیند BC چیست؟ علت را ذکر کنید.</p>  <p>ب) نمودارهای فشار - دما و حجم - دما را رسم نمائید.</p>	۱۱
۱	<p>در یک لوله آزمایش ۱۰cm جیوه موجود است. اگر مساحت مقطع لوله ۱cm^۲ باشد، چه نیرویی از طرف جیوه به کف لوله وارد می شود. ($\rho_{Hg} = ۱۳.۶ \text{ g/cm}^۳$, $g \approx ۱۰ \text{ m/s}^۲$)</p>	۱۲
۱,۵	<p>۱۰۰ گرم یخ ۰°C -۲۰ موجود است. مقدار گرمای لازم برای آنکه این قطعه یخ به بخار ۱۰۰°C برسد، برابر چند کیلو ژول است. (۱/۵ نمره)</p> <p>$C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{\text{J}}{\text{Kg} \cdot \text{°C}}$ و $C_{\text{بخار}} = ۲۱۰۰ \frac{\text{J}}{\text{Kg} \cdot \text{°C}}$ $L_F = ۳۳۰ \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$ و $L_V = ۲۲۰۰ \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$</p>	۱۳
۱	<p>در شکل زیر یک چرخه ی ترمودینامیکی مربوط به نیم مول گاز تک اتمی داده شده است: (۱ نمره)</p> <p>الف) دمای گاز در نقاط تعادل B و C را بر حسب درجه کلون بیابید.</p> <p>ب) نوع فرآیند AB چیست؟ آنرا تعریف کنید.</p> <p>$R = ۸ \frac{\text{J}}{\text{Kg} \cdot \text{°C}}$ $n = ۰.۵ \text{ mol}$</p> 	۱۴
۱	<p>یک مکعب مستطیل به ابعاد ۲۰cm ، ۴۰cm و ۸۰cm و جرم ۱۶Kg را از وجوه مختلف بر روی سطح میز قرار می دهیم. بیشترین فشار ممکن از طرف جسم به سطح میز چند کیلو پاسکال است؟</p> <p>$g \approx ۱۰ \text{ m/s}^۲$</p>	۱۵

موفق باشید

نام درس: فیزیک
تاریخ امتحان: ۹۶/۰۳/۰۶
ساعت امتحان: ۸:۰۰
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
مدیریت منطقه ۲
دبیرستان دوره دوم پسرانه سرای دانش سعادت آباد
پاسخنامه سوالات امتحان پایانی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

نام و نام خانوادگی:
پایه و رشته: تجربی
شماره داوطلب:

محل مهر و امضاء مدیر	نمره به عدد:	نمره به حروف:	نمره تجدید نظر به عدد:	نمره به حروف:
	نام دبیر:	امیرعباس یاری	نام دبیر:	تاریخ و امضاء:
بارم	سوالات			ردیف

	<p>الف) چگالی برابر جرم واحد حجم جسم می باشد. واحد آن در SI، kg/m^3 است. ب) مقدار گرمایی است که به واحد جرم داده می شود تا دمای آن $1^\circ C$ افزایش یابد. واحد آن در SI، $\frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$ است. ج) به مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل یک جسم انرژی مکانیکی آن گفته میشود و واحد آن در SI، ژول است. د) نیروی است بالاسو که برابر وزن شاره جابه جاشده در اثر حضور جسم درون شاره و به جسم از طرف شاره وارد می شود.</p>	۱
	<p>الف) کوچکترین واحد اندازه گیری شده توسط دستگاه اندازه گیری ب) دقت $0.1^\circ C$ خطا $\pm 0.1^\circ C$</p>	۲
	<p>$Wmg = WFN = \cdot (\theta = 90)$ $WF = Fd \cos\theta = 20 \times 6 \times \frac{1}{2} = 60J$ $Wf_k = f_k d \cos\theta = 4 \times 6 \times -1 = -24J$ $W_T = \Delta K = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv^2 \rightarrow 60 - 24 = \frac{1}{2} (2)v^2 \rightarrow v = \sqrt{36} = 6 m/s$</p>	۳
	<p>$E_1 = E_2 \rightarrow V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = 20 m/s$</p>	۴
	<p>الف) $x = \frac{4 \times 10^5 \times 10^2 W}{10^6 W} = 400$ ب) $x = \frac{5 \times 10^{-4} \times 10^{-12} m^2}{10^{-18} m^2} = 500$</p>	۵
	<p>برابر افزایش طول واحد طول به ازای $1^\circ C$ افزایش دما $\Delta v = v_1 \alpha \Delta\theta = 40 \times 3 \times 5 \times 10^{-5} \times 200 = 12 \times 10^{-1} cm^2$</p>	۶

	<p>الف) به درجه سردی یا گرمی جسم، دمای جسم گفته می‌شود. (ب)</p> $F = 1.8\theta + 32 \rightarrow 50 = 1.8\theta + 32 \rightarrow \theta = 10^\circ\text{C} \rightarrow T = 273 + 10 = 283\text{K}$	۷
	<p>نیروی دگر چسبی بین آب و شیشه بیشتر از هم چسبی بین مولکول‌های آب نیروی دگر چسبی بین جیوه و شیشه کمتر از هم چسبی بین مولکول‌های جیوه</p>	۸
	$\theta_e = \frac{m_1 c_1 \theta_1 + m_2 c_2 \theta_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2} \rightarrow 40 = \frac{100 \times 60 \times m_2 \times 20}{100 + m_2}$ $400 + 40m_2 = 6000 + 20m_2 \rightarrow 20m_2 = 2000$ $m_2 = 100\text{g}$	۹
	<p>برای حرکت شاره لایه ای در امتداد افق، افزایش تندی شاره، فشار کاهش می‌یابد.</p> $A_1 v_1 = A_2 v_2 \rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 \rightarrow v_2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \times 5 = 20$	۱۰
	$p_b \times v_b = p_c v_c \leftarrow$ <p>همدما زیرا</p>	۱۱
	$p = \rho gh = 13600 \times 10 \times 10^{-1} = 13600\text{pa}$ $F = PA = 1360 \times 10^{-4} = 1.36\text{N}$	۱۲
	$Q_1 = m_1 c_1 \Delta\theta = 10^{-1} \times 2100 \times 20 = 4200\text{J} = 4.2\text{kJ}$ $Q_1 = mL = 10^{-1} \times 330 = 33\text{kJ}$ $Q_2 = m_2 c_2 \Delta\theta_2 = 10^{-1} \times 4200 \times 100 = 4200\text{J} = 4.2\text{kJ}$ $Q_v = mL_v = 10^{-1} \times 2200 = 220\text{kJ}$ $Q_T = Q_1 + Q_1 = Q_2 + Q_v = 299.2\text{kJ}$	۱۳

$$T_B = \frac{T_B V_B}{nR} = \frac{4 \times 10^2 \times 400 \times 10^{-3}}{.5 \times 8} = 400 J$$

$$T_B = \frac{P_C V_C}{nR} = \frac{2 \times 10^2 \times 800 \times 10^{-3}}{.5 \times 8} = 400 J$$

ب) فرآیند AB هم حجم است.

فرآیند هم حجم فرآیندی است که در طول آن حجم کار ثابت است.

بنابراین به ازای مقدار معینی از گاز در حجم نسبت فشار به دمای گاز نیز ثابت است.

۱۴

$$P_{max} = \frac{F}{A_{min}} = \frac{mg}{A_{min}} = \frac{16 \times 10}{20 \times 40 \times 10^{-4}} = \frac{160 \times 10}{8 \times 10^{-2}} = 2000 Pa = 2 KPa$$

۱۵