



اگرچه نیت خوبی است زیستن ...  
اما خوشکه دست به تصمیم بهتری بزنیم !

[www.konkursara.com](http://www.konkursara.com)

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دانلود بهترین جزوات در

کنکورسرا

کنکورسرا

مرجع تخصصی قبولی آزمون فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش

## فصل ۳

# توان های گویا و عبارات جبری

### ۱.۳ ریشه و توان اعداد حقیقی

در سال گذشته با ریشه های دوم و سوم عددها آشنا شده اید. ریشه و توان رابطه دو سویه ای با هم دارند.

$$(-3)^{\frac{\text{توان سه}}{\text{ریشه سوم}}} = -27 \quad \text{یا} \quad (-3)^3 = -27 \longleftrightarrow \sqrt[3]{-27} = -3$$

**مثال ۱.۳.** در هر مورد جاهای خالی را پر کنید.

$$2^4 = 16 \longleftrightarrow$$

$$11^2 = 121 \longleftrightarrow$$

$$(0.25)^2 = 0.0625 \longleftrightarrow$$

$$(0.5)^2 = 0.25 \longleftrightarrow$$

$$(-9)^3 = 81 \longleftrightarrow$$

$$\sqrt{81} = 9 \longleftrightarrow$$

$$\sqrt[3]{27} = 3 \longleftrightarrow$$

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \longleftrightarrow$$

$$\sqrt{100} = 10 \longleftrightarrow$$

$$\sqrt{1000} = 10\sqrt{10} \longleftrightarrow$$

**مثال ۲.۳.** حجم یک مکعب برابر  $50\text{ cm}^3$  است. ضلع مکعب با دقت یک رقم اعشار چقدر است؟

در حالت کلی توان و ریشه رابطه‌ی عکس با هم دارند. مطالب مطرح شده در بالا را بصورت دقیق‌تر در تعریف زیر آورده‌ایم.

**تعریف ۱.۳.** فرض کنیم  $n \geq 2$  عددی طبیعی باشد. در این صورت عدد حقیقی  $b$  را یک ریشه  $n$  ام عدد حقیقی  $a$  گوییم هرگاه  $b^n = a$  باشد.

مثلاً - ریشه پنجم  $-243 = -3^5$  است چرا که همچنین دو عدد  $2$  و  $-2$  - ریشه چهارم  $16 = 2^4 = (-2)^4$  است. اگر  $n$  زوج باشد عدد حقیقی و مثبت  $a$  دارای دو ریشه  $n$  ام می‌باشد که قرینه یکدیگرند. در این حالت ریشه  $n$  ام مثبت را ریشه  $n$  ام اصلی می‌نامیم و با نماد  $\sqrt[n]{a}$  نشان می‌دهیم. پس حاصل عبارت  $\sqrt[3]{81}$  فقط برابر  $3$  است و هیچگاه از عبارت نادرست  $= -\sqrt[3]{81}$  استفاده نمی‌کنیم. اعداد منفی دارای ریشه  $n$  ام زوج نیستند ولی ریشه  $n$  ام فرد دارند. مثلاً  $\sqrt[3]{-32} = -2$  وجود ندارد اما

**مثال ۳.۳.** کامل کنید.

$$1) \sqrt[3]{64} =$$

$$2); \sqrt[4]{64} =$$

$$3) \sqrt[5]{1024} =$$

$$4) \sqrt[4]{0,0625} =$$

$$5) \sqrt{\frac{121}{100}} =$$

$$6) \sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} =$$

$$7) \sqrt{\frac{36}{25}}$$

$$8) \sqrt[3]{2\frac{1}{27}}$$

$$9) \sqrt[3]{(2\sqrt{2})^2}$$

$$10) \sqrt{8\sqrt{4\sqrt[3]{64}}}$$

مهمترین خواص رادیکال‌ها در زیر فهرست کرده‌ایم.

$$1) \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a & \text{فرد } n \\ |a| & \text{زوج } n \end{cases}$$

$$2) \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} \quad \text{ واضح است که باید } a, b \text{ مثبت باشند.}$$

$$3) \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$4) (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[mn]{a^m} \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad a \geq 0.$$

$$5) \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a} \quad m, n \in \mathbb{N}, \quad a \geq 0.$$

$$6) a \sqrt[n]{b} = \begin{cases} \sqrt[n]{a^n b} & n > 1 \quad \text{فرد } n \\ \sqrt[n]{a^n b} & b \geq 0 \quad a \geq 0 \quad \text{زوج } n \\ -\sqrt[n]{a^n b} & b \geq 0 \quad a \leq 0 \quad \text{زوج } n \end{cases}$$

$$7) \sqrt[mn]{a^m} = \sqrt[n]{a} \quad a > 0, \quad m, n \in \mathbb{N}$$

یادداشت تاریخی: رسم عدد  $\sqrt[3]{2}$  روی محور یا کلا رسم پاره خطی با طول  $\sqrt[3]{2}$  یکی از قدیمی‌ترین مسائل در تاریخ ریاضیات است. این مسئله به تضعیف مکعب معروف است. داستانی نقل می‌کنند که یکی از فراعنه مصر که مقبره‌ای برای فرزندش می‌ساخته (مقبره به شکل مکعب مستطیل بوده است. البته مدفن اصلی مقبره) به مهندسان دستور داده که مقبره کوچک است و آن را دو برابر کنید. مهندسان به اشتباه اضلاع مکعب را دو برابر کرده‌اند و مقبره بسیار بزرگتر از انتظار پادشاه بود. در واقع مکعب مستطیلی که حجم آن دو برابر دیگری باشد نیاز به ترسیم و استفاده از عدد  $\sqrt[3]{2}$  دارد. اما به کمک خط‌کش و پرگار ساده این کار امکان‌پذیر نیست. در این زمینه می‌توانید مسئله تضعیف مکعب را در گوگل جستجو کنید. حال ممکن است این سوال به ذهنتان خطور کند که از کجا بدانیم چه اعدادی را می‌شود با خط‌کش و پرگار ترسیم کرد. پاسخ دقیق به این پرسش درحال حاضر با اطلاعات شما غیرممکن است اما بطور خلاصه می‌توان گفت تمام اعداد گویا ترسیم پذیرند. عددی حقیقی چون ۲ ترسیم پذیر با خط‌کش و پرگار است هرگاه بتوان با تعداد متناهی عملیات جمع یا تفریق یا ضرب یا تقسیم و یا ریشه دوم گرفتن از اعداد صحیح حاصل شود. پس با این حساب چون ۲ و ۳ ترسیم پذیرند پس عدد  $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{2}$  نیز ترسیم پذیر است.

تذکر مهم: آیا بدون استفاده از ماشین حساب می‌توان مقدار تقریبی (اما با دقت بالا) رادیکال‌ها را بدست آورد؟ پاسخ مثبت است. دستور زیر در این ارتباط بسیار مفید است:

$$\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a^n \pm b} \approx a \pm \frac{b}{na^{n-1}}$$

$$\sqrt[3]{65} = \sqrt[3]{4^3 + 1} \approx 4 + \frac{1}{3 \times 4^2} = 4 + 0,02 = 4,02$$

$$\sqrt[5]{30} = \sqrt[5]{25 - 2} \approx 2 - \frac{2}{5 \times 2^4} = 2 - 0,02 = 1,98$$

**مثال ۴.۳.** درست و نادرست را مشخص کنید.

- ۱ - هر عدد حقیقی دو ریشه پنجم دارد که قرینه یکدیگرند.
- ۲ - ریشه‌های چهارم عدد ۱۶ دو عدد  $\sqrt[4]{16} \pm i\sqrt[4]{16}$  می‌باشند
- ۳ - هر عدد همواره ریشه  $n$  ام دارد.
- ۴ - هر عدد فرد همواره دارای ریشه هفتم است.

**مثال ۵.۳.** آیا رابطه  $\sqrt[n]{a+b} = \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$  درست است؟ چرا؟

**مثال ۶.۳.** آیا رابطه  $a = (\sqrt[n]{a})^n$  همیشه درست است؟ چرا؟

**مثال ۷.۳.** اگر  $x = \sqrt[n]{a}$  باشد و فرجه  $n$  را افزایش دهیم برای مقدار  $x$  چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگتر می‌شود یا کوچکتر می‌شود؟

**مثال ۸.۳.** از دو عدد  $\sqrt[3]{2}$  و  $\sqrt[4]{3}$  کدام بزرگتر است؟

**مثال ۹.۳.** عدد  $\sqrt[3]{321}$  مابین کدام دو عدد صحیح متوالی است؟

**مثال ۱۰.۳.** کامل کنید.

$$۱) \sqrt[۵]{۱۲۵} =$$

$$۲) \sqrt[۶]{-۳۲} =$$

$$۳) \sqrt[۷]{۱۲۸} =$$

$$۴) \sqrt[۸]{۲۵۶} =$$

$$۵) \sqrt[۹]{-۱} =$$

$$۶) \sqrt[۱۰]{۶۲۵} =$$

$$۷) -\sqrt[۱۱]{۱۶} =$$

$$۸) \sqrt[۱۲]{-\frac{۱}{۳۲}} =$$

$$۹) \sqrt[۱۳]{-۰,۰۰۱} =$$

$$۱۰) \sqrt[۱۴]{۰} =$$

$$۱۱) \sqrt[۱۵]{(-۲)^۴} =$$

$$۱۲) \sqrt[۱۶]{(-۲)^۶} =$$

$$۱۳) \sqrt[۱۷]{۱۶} \times \sqrt[۱۸]{۸۱} =$$

$$۱۴) a^{\frac{۱}{۲}} \bigcirc a^{\frac{۳}{۲}} \quad ۰ < a < ۱$$

$$۱۵) \sqrt{a} \bigcirc \sqrt[۳]{a} \quad ۰ < a < ۱$$

$$۱۶) \sqrt[۴]{a} \bigcirc \sqrt[۵]{a} \quad ۰ < a < ۱$$

$$۱۷) (\sqrt[۶]{۱۶})^۴ =$$

$$۱۸) (\sqrt[۷]{-۸})^۲ =$$

$$۱۹) \sqrt[۲۰]{۱۵۰} =$$

$$۲۰) \sqrt[۲۱]{۴۸۶} =$$

$$۲۱) \sqrt[۲۲]{۱۰۸۰} =$$

$$۲۲) \sqrt[۲۳]{۸۰۰}$$

$$۲۳) \sqrt[۲۴]{\frac{۳}{۴}} \times \sqrt[۲۵]{\frac{۹}{۱۶}} =$$

$$۲۴) \sqrt[۲۶]{۱۲۸ \times ۳۱۴}$$

**مثال ۱۱.۳.** حاصل عبارات زیر را تا سرحدامکان ساده کنید.

$$۱) \sqrt[۴]{\frac{(a+b)^۴}{(a-b)^۴}} =$$

$$۲) \sqrt{۴x^۲ + ۴x + ۱} =$$

$$۳) \frac{\sqrt{x^۳y^۳}}{\sqrt{xy}}$$

$$۴) ۲\sqrt{۲۷} \times ۳\sqrt{۱۲} =$$

$$۵) \sqrt[۳]{a^۲} \times \sqrt[۴]{a^۳} =$$

$$۶) \sqrt[۵]{a^۳} \times \sqrt[۶]{a^۵} \times \sqrt[۳]{a^۳} =$$

$$۷) \sqrt[۴]{۴ - ۲\sqrt{۲}} \times \sqrt[۶]{۶ + ۴\sqrt{۲}} =$$

$$۸) \sqrt[۳]{۲\sqrt{۲\sqrt[۳]{۲}}} =$$

$$۹) \sqrt[۴]{۶ + ۴\sqrt{۲}} \times \sqrt{۲ - \sqrt{۲}} =$$

$$۱۰) \sqrt{(c-۱)^۲} - \sqrt{(۱+c)^۲} = \quad , c \in [-۱, ۱]$$

$$۱۱) (۲\sqrt{۲} - \sqrt{۵} + ۳\sqrt{۲})(\sqrt{۱۸} - \sqrt{۲۰} + ۲\sqrt{۲})$$

تمرین ۱.۳. حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

$$۱) \sqrt[5]{-32(x-y)^{10}} =$$

$$۲) \sqrt[3]{-(x-y)^6} =$$

$$۳) \sqrt[3]{27c^7} =$$

$$۴) \sqrt[3]{24} \times \sqrt[3]{2} =$$

$$۵) \mp \sqrt{6/25} =$$

$$۶) \sqrt[3]{\sqrt{2}+1} \times \sqrt[3]{\sqrt{2}-1} =$$

$$۷) \sqrt{2\sqrt{2}-\sqrt{3}} \times \sqrt[3]{11+4\sqrt{6}} =$$

$$۸) \sqrt{31} \times \sqrt{6-\sqrt{5}} \times \sqrt{3+\sqrt{3-\sqrt{5}}} \times \sqrt{3-\sqrt{3-\sqrt{5}}} =$$

$$۹) \sqrt{11-2\sqrt{2}} =$$

$$۱۰) \sqrt{13+\sqrt{48}} =$$

$$۱۱) \sqrt{2+\sqrt{3}} \times \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}} \times \\ \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}}} =$$

$$۱۲) \sqrt[4]{\frac{-243}{x^4 - \sqrt{x^4 + 6x^2 + 9}}} =$$

$$۱۳) x\sqrt{-x} \times \sqrt[3]{x} =$$

## ۲.۳ توان‌های گویا

از کلاس نهم برخی مطالب را در مورد توان می‌دانید. با اینحال جهت مرور، مطالب زیر را آورده‌ایم.

**تعریف ۲.۳.** فرض کنید  $n \in \mathbb{N}$  باشد و  $a \in \mathbb{R}$  عددی دلخواه. عدد  $a^n$  را بصورت:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ مرتبه}}$$

تعریف می‌کنیم. برای اعداد صحیح منفی نیز این تعریف قابل تعمیم است.  $a^{-n}$  را بصورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

در نهایت  $1 = a^0$  تعریف می‌شود و حال  $a^n$  را برای تمام اعداد صحیح تعریف کرده‌ایم. مهمترین خواص توان عبارتند از:

$$1 - \text{همواره} \quad a^n \times a^m = a^{m+n}$$

$$2 - \text{همواره} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$3 - \text{همواره} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

پرسش: آیا دو مقدار  $a^{m^n}$  و  $(a^m)^n$  مساوی‌اند؟ چرا؟

حال می‌خواهیم توان را به اعداد گویا تعمیم دهیم.

گازی با فشار وارد یک مخزن می‌شود. در هر دقیقه فشار گاز دو برابر می‌شود تا به فشار معینی برسد.

دقیقه	۱	۲	۳	...	$n$
فشار	۲	$2^2$	$2^3$	...	$2^n$

حال پرسش این است که در ۳۰ ثانیه پس از دقیقه دوم فشار گاز چقدر خواهد بود؟ واضح است که جواب عددی چون  $a$  است که  $2^3 < a < 2^2$ . چون زمان دقیق را داریم پس می‌توان ادعا کرد که  $a = 2^{\frac{5}{6}}$  که البته درست است اما چه معنایی می‌دهد؟ اگر تصور کنیم مقدار فشار در هر ۳۰ ثانیه  $x$  برابر می‌شود پس باید بعد از ۱ دقیقه  $x \times x = x^2$  برابر شود اما بعد از یک دقیقه دو برابر فشار داریم یعنی  $2 = x^2$  و لذا  $x = \sqrt{2}$ . حال کل زمان دو نیم دقیقه شامل ۵ زمان ۳۰ ثانیه است پس فشار می‌شود  $x^5 = \sqrt[5]{2^5}$  یعنی  $a = x^5 = \sqrt[5]{2^5}$ . بعه عبارت بهتر باید داشته باشیم

$$2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[5]{2^5}$$

حال می‌توان در حالت کلی توان گویایی یک عدد حقیقی را تعریف کرد.

**تعريف ۳.۳.** فرض کنید  $a$  عددی حقیقی باشد. اگر  $m, n \in \mathbb{N}$  باشند تعریف می‌کنیم:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

**مثال ۱۲.۳.** حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

$$1) (-8)^{\frac{1}{3}} =$$

$$2) 8^{\frac{5}{3}} =$$

$$3) (32)^{-\frac{1}{5}} =$$

$$4) (-8)^{\frac{1}{2}} =$$

$$5) \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}\sqrt[5]{y}}{\sqrt[6]{z}}} =$$

$$6) (0.25)^{\frac{3}{2}} =$$

$$7) \sqrt[5]{2\sqrt[3]{\sqrt{8}}} + (\sqrt[5]{\sqrt{2}})^3 - 2^{0.3} - 8^{-0.1} =$$

**تمرین ۲۰۳.** درستی روابط حاکم بر اعداد تواندار که قبلا در مورد توان های صحیح گفته شده را در مورد توان های گویا تحقیق کنید. بعنوان نمونه

$$\begin{aligned} a^r \times a^s &= a^{\frac{m}{n}} \times a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[n]{a^m} \times \sqrt[q]{a^p} \\ &= \sqrt[nq]{a^{mq}} \times \sqrt[nq]{a^{pn}} \\ &= \sqrt[nq]{a^{qm+pn}} \\ &= a^{\frac{pn+qm}{nq}} \\ &= a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}} \\ &= a^{r+s} \end{aligned}$$

**مثال ۱۳.۳.** آیا تساوی  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$  درست است؟ در مورد جواب بحث کنید.

**مثال ۱۴.۳.** هرگاه  $1 < a$  باشد ثابت کنید  $a^{n-1} < a^n < a^{n+1}$ . در حالتی که  $1 < a < 0$  باشد چه حکمی می‌توان کرد؟ ادعای خود را ثابت کنید.

**مثال ۱۵.۳.** آیا محاسبه زیر درست است؟

$$\sqrt[4]{(-3)^4} = \left[ (-3)^4 \right]^{\frac{1}{4}} = \left[ (-3)^{\frac{1}{4}} \right]^4 = (-3)^{\frac{1 \times 4}{4}} = (-3)^1 = -3$$

**مثال ۱۶.۳.** نیلوفر و کیوان هر کدام عبارت  $\sqrt[3]{a^2}$  را ساده کرده اند. جوابهای آنها بصورت زیر است. جواب کدام دقیق تر است؟ چرا؟

$$\text{راه حل کیوان} \longrightarrow \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a}$$

$$\text{راه حل نیلوفر} \longrightarrow \sqrt[3]{a^2} = \begin{cases} \sqrt[3]{a} & a > 0 \\ \sqrt[3]{-a} & a < 0 \end{cases}$$

**مثال ۱۷.۳.** از رابطه  $(\frac{1}{2})^{2\alpha-3} = 4 \times 16^\alpha$  مقدار  $\alpha$  را بیابید.

تمرین ۳۰.۳. حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

$$1) (\frac{3}{8})^{-\frac{2}{3}}$$

$$2) \left( \sqrt[3]{\frac{x}{y}} \right)^2 \times \sqrt{\frac{1}{xy}} \times \left( \sqrt[3]{\frac{y}{x}} \right)^{-1}$$

$$3) \left( a^{\frac{5}{4}} \right)^{\circ 7} \div \left( d^{-\frac{1}{4}} \right)^{-\frac{3}{2}}$$

$$4) \left( a^{\frac{1}{4}} y^{-\frac{2}{3}} \right)^{\frac{6}{5}} \times a^{\frac{1}{3}} \times y^{\frac{4}{5}}$$

$$5) \left( \sqrt[3]{32} \sqrt[4]{16} \sqrt[5]{128} \div \sqrt[4]{1024} \sqrt[5]{256} \sqrt[3]{64} \right)^{-\frac{3}{53}} \quad 6) 0.027^{-\frac{1}{3}} - \left( -\frac{1}{6} \right)^{-2} + 256^{0.75}$$

$$7) \frac{\sqrt{\frac{x}{y}} \sqrt{\frac{y}{x}} \sqrt{\frac{x}{y}}}{\sqrt{\frac{y}{x}} \sqrt{\frac{x}{y}} \sqrt[3]{\frac{y}{x}}}$$

$$8) \left( \frac{1}{3} \right)^{p+2} \cdot \sqrt{\frac{1}{27}} \geq 9 \longrightarrow p = ?$$

### ۳.۳ عبارت‌های جبری

در این بخش به معرفی چند اتحاد جبری دیگر و استفاده از آنها در تجزیه عبارت‌های جبری می‌پردازیم. از کلاس نهم با اتحاد‌ها آشنا شده‌اید. یک تساوی که به ازای تمامی مقادیر متغیر موجود در آن تساوی درست باشد را یک اتحاد گوییم. به دو تساوی زیر دقت کنید.

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \quad (1.3)$$

$$x^2 - 5 = 4 \quad (2.3)$$

تساوی (۱.۳) به ازای تمامی مقادیر  $x, y$  درست است و لذا به آن اتحاد گوییم. در حالیکه تساوی (۲.۳) به ازای دو مقدار  $x = -3, x = 3$  درست است و لذا به آن معادله گوییم. از کلاس نهم با برخی اتحادها آشنا شده‌اید. در اینجا آن اتحادها را بازنویسی می‌کنیم.

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$

حال آماده هستیم تا چند اتحاد جدید معرفی کنیم. اولین اتحاد، اتحاد مربع سه جمله‌ای است. یعنی هدف یافتن حاصل  $(x + y)^3$  است. به کمک اتحادهای بالا عبارت فوق را تا سرحد امکان ساده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (x + y)^3 &= (x + y)^2 \times (x + y) \\ &= (x^2 + 2xy + y^2) \times (x + y) \\ &= x^3 + x^2y + 2x^2y + 2xy^2 + y^2x + y^3 \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \end{aligned}$$

بنابراین نتیجه حاصل بصورت زیر بدست می‌آید:

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

اگر در رابطه فوق  $(b -)$  تبدیل شود اتحاد زیر حاصل می‌شود:

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

در نهایت اگر از  $xy$  در جملات دوم و سوم فاکتور بگیریم خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (x + y)^3 - 3xy(x + y) \\ x^3 - y^3 &= (x - y)^3 + 3xy(x - y) \end{aligned}$$

**مثال ۱۸.۳.** به کمک آخرین رابطه عبارت‌های  $x^3 - y^3$  و  $x^3 + y^3$  را تجزیه کنید.

نتیجه مثال بالا به قدری اهمیت دارد که به آنها اسم اتحاد مجموع و تفاضل مکعبات بدهیم:

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) \\ x^3 - y^3 &= (x - y)(x^2 + xy + y^2) \end{aligned}$$

**مثال ۱۹.۳.** حاصل عبارات زیر را به کمک اتحادها بدست آورید.

$$1) (2x - y^2)^2 =$$

$$2) (\frac{x}{4} - \frac{y}{3})^2 =$$

$$3) (x - y)(x + y)(x^2 + x^2y^2 + y^2) = \quad 4) (2x - 1)^3 =$$

$$5) (1 + x^2 + x^4)(1 - x^2) =$$

$$6) (101)^3 =$$

$$7) (x - \frac{1}{2})(\lambda x^2 + 2)(2x + 1) =$$

$$8) (x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2) - 8y^3 =$$

$$9) \frac{(x + 1)^3 - 3(x + 1)^2 + 3(x + 1) - 1}{(x + 1)^2 - 2(x + 1) + 1} \quad 10) (x - 1)(x^2 + x + 1)(x^3 + 1)$$

$$11) (2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2)(\lambda x^2 + y^2) \quad 12) (a - b - c)^2 - (a - b + c)^2$$

**مثال ۲۰.۳.** فرض کنید  $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ . باشد. حاصل عددی عبارات زیر را بدست آورید.

$$1) x^2 + \frac{1}{x^2} =$$

$$2) x^3 + \frac{1}{x^3} =$$

$$3) x^4 - \frac{1}{x^4} =$$

$$4) x^5 + \frac{1}{x^5} =$$

$$5) x^6 + \frac{1}{x^6} =$$

**مثال ۲۱.۳.** به کمک اتحادها عبارات زیر را تجزیه کنید.

$$1) x^6 - y^6 =$$

$$2) x^3 - 125$$

$$3) 27x^3 + 1$$

$$4) 4a^2 - b^2 - 2b + 4a =$$

$$5) 9x^3 - 3x - 2 =$$

$$6) x^3 - x^2 - x + 1 =$$

$$7) a^4 - 2a^2 + 49 =$$

$$8) x^2y^2 - x^2y^2 - 1 + y =$$

$$9) 64x^3 - 48x^2 + 12x - 1 =$$

$$10) 4a^4 - 64 =$$

$$11) (x + 1)^3 + 8 =$$

$$12) x^5 + x + 1 = \quad (hint : x^2 - x^4)$$

$$13) 4x^4 + 1$$

$$14) 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1 =$$

تمرین ۴.۳. به کمک اتحادها حاصل عبارات زیر را بیابید.

$$۱) (x - ۲y^2)^2 - (x + ۲y^2)^2$$

$$۲) (\frac{۳}{۲}xy - \frac{۱}{۲}y)^2$$

$$۳) (۲m - n)(۴m^2 + ۲mn + n^2)$$

$$۴) (x + ۲y)(x^2 - ۲xy + ۴y^2)$$

$$۵) (۲ + x)(۴ - ۲x + x^2)(۸ - x^3)$$

$$۶) (x - y)^3 - (x + y)^3$$

$$۷) (۲x - y)(۴x^2 + y^2)(۲x + y) + y^4$$

$$۸) (a - b + c)(a - b - c)$$

تمرین ۵.۳. تجزیه کنید.

$$۱) ab - a^2b^2$$

$$۲) a + b + a^2 - b^2$$

$$۳) a^2 - b^2 + a^3 - b^3$$

$$۴) x^6 - (yz)^6$$

$$۵) ۳۶a^4b - ۱۶b^5$$

$$۶) a^2c^2 + b^2d^2 - b^2c^2 - a^2d^2 - ۴abcd$$

$$۷) c^5 + p^5$$

$$۸) x^3 + ۶۴m^3$$

$$۹) (a + b)^3 - (a - b)^3 - ۲b$$

$$۱۰) (a + b)^3 + (a - b)^3 - ۳a$$

## کاربرد تجزیه در یافتن ب م و ک م م چندجمله‌ایها

یک چندجمله‌ای مثل  $a + b$  را در نظر بگیرید. اگر این دو جمله‌ای را در اعداد صحیح یا هر چندجمله‌ای دیگری ضرب کنیم، حاصل را مضربی از  $a + b$  گوییم. پس عبارات زیر همگی مضارب  $a + b$  هستند.

$$۲(a + b), (a^2 - b^2), (a^3 - b^3) \dots$$

همچنین عبارت  $a + b$  مقسوم علیه مشترک هر سه عبارت فوق است. بطور کلی برای یافتن بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دو عبارت جبری ابتدا آنها را تجزیه کرده و سپس برای ب م عوامل مشترک با کمترین توان در تجزیه را منظور می‌کنیم و برای ک م هم عوامل مشترک را با بزرگترین توان در عوامل غیرمشترک ضرب می‌کنیم. به عنوان یک مثال ساده فرض کنید هدف یافتن ب م و ک م دو عبارت جبری  $a^2 - b^2$ ,  $a^3 - b^3$  است. با تجزیه کردن آنها داریم:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \\ a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \end{cases}$$

پس با این حساب ب م م برابر  $a - b$  است و ک م م برابر  $(a - b)(a + b)(a^2 + ab + b^2)$  . یکی از فواید محاسبه ک م م در مخرج مشترک گرفتن برای جمع و تفریق عبارات گویاست. در قسمت بعد عبارات گویا را بررسی می‌کنیم.

## عبارات گویا

**تعریف ۴.۳.** منظور از یک عبارت گویا عبارتی است که صورت و مخرج آن چندجمله‌ای باشند. اگر

دو چندجمله‌ای باشند عبارت

$$\frac{p(x)}{q(x)}$$

را یک عبارت گویا گوییم. شرط تعریف چنین عبارتی آنست که  $q(x) \neq 0$  باشد.

**مثال ۲۲.۳.** معین کنید هر عبارت گویا به ازای چه مقادیری از متغیرش تعریف شده است؟ (دامنه‌ی تعریف آن را بیابید)

$$1) f(x) = \frac{x+1}{x-3}$$

$$2) g(x) = \frac{3y}{y^2 - 4}$$

$$3) h(x) = \frac{x^3 + 1}{x^4 + 1}$$

$$4) k(x) = \frac{z}{2z^2 - 7z + 5}$$

$$5) \ell(x) = \frac{x}{x}$$

$$6) u(x) = \frac{3}{2x^2 + 2x} + \frac{2x-1}{x^2-1} - \frac{2}{x}$$

**مثال ۲۳.۳.** عملیات‌های خواسته شده بر عبارات گویا را انجام دهید. اگر تنها یک کسر در صورت مسئله است هدف ساده کردن آن است.

$$1) \frac{6x^2 + 7x - 3}{2x^2 - x - 6}$$

$$2) \frac{13}{2x - 6} - \frac{2x}{x^2 - 9}$$

$$3) \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \div (x + y)$$

$$4) \frac{m^3 - n^3}{(mn - n^2)^2} \div \frac{mn + m^2}{m^2 - n^2}$$

$$5) a \div \frac{a - 1}{2} - \frac{a^3 + 3a(a - 1) - 1}{2a^2 + 2a} \times \frac{-4a}{a^2 - 2a + 1} - \frac{4a^2}{a^2 - 1}$$

$$6) \left( \frac{n}{m-n} + \frac{m}{m+n} \right) \left( \frac{m+n}{m^2 + n^2} \right) \left( \frac{m-n}{m+n} \right)$$

## حذف رادیکال از عبارات جبری

در اتحاد  $a = \sqrt[3]{x}$ ,  $b = 1$  اگر قرار دهیم  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$  آنگاه:

$$(\sqrt[3]{x})^3 - 1 = \underbrace{(x - 1)}_{\text{بدون رادیکال}} = \underbrace{(\sqrt[3]{x} - 1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}_{\text{عبارت شامل رادیکالها}}$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با ضرب دو عبارت در هم حاصل یک عبارت فارغ از رادیکال است. این کار اغلب به گویا کردن معروف است و یک دلیل ساده این کار این است که کلا کار با چند جمله‌ایها و عملیات بر آنها بسیار ساده‌تر از کار با عبارات رادیکالی است. بویژه زمانی که عبارت رادیکالی در مخرج باشد، از بین بردن رادیکال آن امری مستحب است. به عنوان مثال ساده مخرج عبارت  $\frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$  را گویا می‌کنیم.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \times \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \\ &= \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{x - y} \end{aligned}$$

**مثال ۲۴.۳.** مخرج کسرهای زیر را گویا کنید.

$$۱) \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt[3]{y}}$$

$$۲) \frac{1}{\sqrt{x} - ۲}$$

$$۳) \frac{1}{\sqrt[۳]{x^۴} - \sqrt[۳]{x} + ۱}$$

$$۴) \frac{1}{a^{\frac{۱}{۴}} + a^{\frac{۱}{۴}}b^{\frac{۱}{۴}} + b^{\frac{۱}{۴}}}$$

$$۵) \frac{a - ۱}{\sqrt{a - ۱} - \sqrt{a + ۲}}$$

$$۶) \frac{1}{\sqrt[۳]{x} + ۱}$$

$$۷) \frac{1}{۱ + \sqrt{۲} + \sqrt{۳}}$$

## تمرینات تکمیلی

تمرین ۶.۳. حاصل عبارات زیر را بدست آورید.

$$1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x^{-1}y^3\right)^{-2} \cdot \left(\frac{x^2}{y^2}\right)^{-1} \cdot \left(-\frac{2x^2}{y^3}\right)^{-4}$$

$$2) 125 \leq \left(\frac{1}{5}\right)^p \leq 3125 \rightarrow p = ?$$

$$3) 10^{20} \square 20^{10}$$

$$4) 20^{2303} \square 30^{3202}$$

$$5) \frac{\sqrt[3]{32}}{\sqrt{8}} \times \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{48}}$$

$$6) \left(27^{\frac{1}{3}} \times 8^{\frac{2}{3}} \times 32^{\frac{2}{5}} \times 81^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$7) (4 + \sqrt{15})(\sqrt{10} - \sqrt{6})(\sqrt{4 - \sqrt{15}})$$

$$8) \sqrt{17 - 4\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}}$$

تمرین ۷.۳. عبارت‌هایی که بصورت مجموع چندجمله‌اند را تجزیه‌کنید و آنهایی که بصورت حاصلضرب چند پرانتز هستند به کمک اتحادها ضرب کرده و ساده کنید. عملیات بر عبارات گویا را نیز انجام دهید.

$$1) (1 + x + x^2)(1 - x)(1 + x)(1 - x + x^2) \quad 2) p^4 - 6p^2q + 9q^2$$

$$3) x^3y^3 + 6x^2y^2 + 12xy + 8 \quad 4) (x + 3z - y)(x - y - 3z)$$

$$5) (a^6 - 3a^3 + 9)(a^3 + 3) \quad 6) x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$7) 2 - b^3y^3 - by \quad 8) x^3 - 8 + (x + 2)^2 - 2x$$

$$9) 8 - 2x - x^2 \quad 10) \frac{3x^2 + 12x + 9}{x^6 + 5x^3 + 6}$$

$$11) \frac{a^2 - 1}{a} \times \frac{a^3}{a - 1} \times \frac{1}{a + 1} \quad 12) \left(\frac{x^2}{x - y} - y\right) \left(x + \frac{y^2}{x + y}\right)^{-1}$$

$$13) \frac{1}{a^2 + 3a + 2} + \frac{2a}{a^2 + 4a + 3} + \frac{1}{a^2 + 5a + 6} \quad 14) \frac{y}{x + z} - \frac{1}{y(yxz + x + z)}$$

$$15) \frac{1}{x\sqrt{y} + y\sqrt{x}} \quad \text{گویا کنید,}$$

$$16) \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}}$$

$$17) \frac{1}{\sqrt[3]{x} - \sqrt{y}}$$

$$18) \frac{1}{1 + \sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

### ۴.۳ تست‌های فصل سوم

۱- اگر  $x + y = 7$  و  $xy = 5$  باشد، حاصل  $x^3 + y^3$  کدام است؟

۲۶۴ (۴)      ۲۴۴ (۳)      ۲۳۸ (۲)      ۲۱۶ (۱)

۲- در تجزیه‌ی عبارت  $(x^2 - 6x - 4)^2$  کدام عامل ضرب وجود ندارد؟

$x+4$  (۴)       $x+2$  (۳)       $x-4$  (۲)       $x-8$  (۱)

۳- حاصل  $\sqrt{\frac{19}{6}} + \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{4}}$  کدام است؟

۲ (۴)      ۱ (۳)       $\frac{1}{2}$  (۲)       $\frac{1}{3}$  (۱)

۴- کوچک‌ترین مضرب مشترک دو چندجمله‌ای  $x^2 - 10x + 21$  و  $x^2 - 12x + 35$  را برابر بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک آن‌ها تقسیم کرده‌ایم، حاصل تقسیم کدام است؟

$x^2 + 8x - 15$  (۴)       $x^2 + 8x + 15$  (۳)       $x^2 - 8x + 15$  (۲)       $x^2 - 8x - 15$  (۱)

۵- حاصل عبارت  $\left(\sqrt{\frac{2}{4}} - \sqrt{\frac{3}{9}}\right) \sqrt{\frac{6}{50}}$  کدام است؟

$\frac{1}{20}$  (۴)       $\frac{1}{20}$  (۳)       $\frac{1}{15}$  (۲)       $\frac{1}{10}$  (۱)

۶- به ازای چه مقدار  $m$ ، عبارت  $4x^2 - 6x + m$  مربع کامل است؟

$\frac{3}{2}$  (۴)       $\frac{2}{3}$  (۳)       $\frac{9}{4}$  (۲)       $\frac{4}{9}$  (۱)

۷- حاصل  $999^2 - 1001^2$  کدام است؟

۶۰۰۰ (۴)      ۴۰۰۰ (۳)      ۲۰۰۰ (۲)      ۱۰۰۰ (۱)

۸- در تجزیه‌ی عبارت  $4a^2 - 4a - b^2 - 4b$  کدام عامل وجود دارد؟

$2a + b + 1$  (۴)       $2a + b - 3$  (۳)       $2a - b + 1$  (۲)       $2a + b + 3$  (۱)

۹- حاصل عبارت  $(x^2 + x + 1)(x^2 - 1)$  کدام است؟

$x^6 - 1$  (۴)       $x^3 - 1$  (۳)       $(x - 1)^3(x^3 + 1)$  (۲)       $(x - 1)^2(x^3 + 1)$  (۱)

۱۰- مجموع ریشه‌های معادله‌ی  $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$  کدام است؟

-۳ (۴)      ۳ (۳)      ۱ (۲)      ۱) صفر (۱)

۱۱- اگر عبارت  $4x^2 - 3x + A$  مربع دوجمله‌ای باشد، A کدام است؟

$\frac{9}{16}(4)$        $\frac{9}{4}(3)$        $\frac{3}{4}(2)$        $\frac{3}{2}(1)$

۱۲- اگر  $x = 4$  باشد، حاصل  $\sqrt{(-x)^2} + \sqrt{(1-x)^4}$  کدام است؟

$-7(4)$        $7(3)$        $-9(2)$        $9(1)$

۱۳- اگر عبارت  $4x^2 - 3x + A$  مربع دوجمله‌ای باشد، A کدام است؟

$\frac{9}{16}(4)$        $\frac{9}{4}(3)$        $\frac{3}{4}(2)$        $\frac{3}{2}(1)$

۱۴- عبارت  $6 - 5x^2$  بر کدام عبارت زیر بخش‌پذیر است؟

$3x + 4(4)$        $2x - 3(3)$        $2x + 3(2)$        $3x - 2(1)$

۱۵- عبارت  $\frac{3x^3 + 5x^2 - 4x - 20}{x - 5}$  بر کدام دوجمله‌ای بخش‌پذیر نیست؟

$x + 5(4)$        $x + 2(2)$        $x - 2(1)$

۱۶- در کدام گزینه فاکتورگیری درست انجام نشده است؟

$$3x^2a + 9a^2x = 3ax(x + 3a) \quad (1)$$

$$49x^2yz + 14x^3y^2 = 7x^2y(7z + 2xy) \quad (2)$$

$$19xab + 38a^2x + 2xa = 19xa(b + 2a + 2) \quad (3)$$

$$18x^2ab + 15x^3a + 3x^2a = 3x^2a(6b + 5x + 1) \quad (4)$$

۱۷- اگر  $a - \frac{1}{a} = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ ، ( $a > 1$ ) باشد، حاصل  $a + \frac{1}{a}$  برابر کدام است؟

$2(4)$        $\frac{4\sqrt{3}}{3}(3)$        $\frac{3\sqrt{3}}{2}(2)$        $(1)$

۱۸- ساده شده‌ی عبارت  $\sqrt{\sqrt{12} - \sqrt{3}} - \sqrt{3\sqrt{27}}$  کدام است؟

$-3\sqrt{2}(4)$        $\sqrt[4]{2}(3)$        $6\sqrt{3}(2)$        $-2\sqrt[4]{3}(1)$

## ریاضی(۱) دوره متوسطه‌ی دوم رشته ریاضی و تجربی

۱۹- حاصل عبارت  $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 - \frac{4}{x}\left(x^2 + \frac{1}{16}\right)$  کدام است؟ (۰)

۱ (۳)      ۲ (۴)      ۳ (۲)      ۴ (۱)

۲۰- اگر  $a + b = 2$  و  $ab = 1$  باشد، مقدار  $a^3 + b^3$  کدام است؟ (۰)

۱ (۳)      ۲ (۴)      ۳ (۲)      ۴ (۱)

۲۱- عبارت  $(a - 2)(a + 2)(a^4 + 4a^2 + 16)$  با کدام عبارت زیر برابر است؟ (۰)

$(a^3 - 8)(a^3 + 8)$  (۲)       $a^6 + 64$  (۱)  
 $a^8 - 64$  (۴)       $(a^3 - 4)(a^3 + 4)$  (۳)

۲۲- در تجزیه‌ی  $4a^4 - 64$  کدام عامل وجود ندارد؟ (۰)

$a - 2$  (۳)       $a + 2$  (۲)       $a^2 + 4$  (۱)

$a^2 - 8$  (۴)

۲۳- در تجزیه‌ی عبارت  $x^2 - 1 + (x - 1)(y + 1)$ ، کدام عامل وجود دارد؟ (۰)

$x - y + 1$  (۳)       $x + y - 1$  (۲)       $x + y + 2$  (۱)

$x + y$  (۴)

۲۴- کدام عامل در تجزیه‌ی عبارت  $3x^2 - 5x - 2$  وجود دارد؟ (۰)

$x - 1$  (۳)       $3x + 1$  (۲)       $3x - 1$  (۱)

۲۵- حاصل عبارت  $\sqrt[3]{3} + \sqrt{\sqrt{18}} - \frac{(\sqrt[3]{24} - \sqrt{32})}{2}$  کدام است؟ (۰)

$-2\sqrt[3]{3}$  (۳)       $5\sqrt{2}$  (۲)       $\sqrt{2}$  (۱)

$2\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$  (۴)

۲۶- حاصل  $A = \sqrt[9]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{\frac{1}{2}}}}}$  کدام است؟ (۰)

$9\sqrt[3]{3^7}$  (۴)       $3\sqrt[3]{3^8}$  (۳)       $3\sqrt[3]{3^7}$  (۲)       $\sqrt[3]{3^7}$  (۱)

۲۷- مقدار عبارت  $x^3 - 48x^2 + 12x - 64$  به ازای  $x = \frac{1}{\lambda}$  کدام است؟ (۰)

$\frac{1}{2}$  (۴)       $\frac{3}{5}$  (۳)       $-\frac{1}{\lambda}$  (۲)       $-\frac{2}{3}$  (۱)

## ریاضی(۱) دوره متوسطه‌ی دوم رشته ریاضی و تجربی

-۲۸ در حالت کلی، کدام عامل زیر در تجزیه‌ی عبارت  $x^2y^2 - 1 + y^3x^2$  وجود ندارد؟

$xy + 1$  (۴)       $xy - 1$  (۳)       $1 + y$  (۲)       $1 - y$  (۱)

-۲۹ در تجزیه‌ی عبارت  $14 - 25x^2 - 25x$  همواره کدام‌یک از عامل‌های زیر وجود دارد؟

$5x - 7$  (۴)       $5x - 2$  (۳)       $5x + 14$  (۲)       $5x + 1$  (۱)

-۳۰ در تجزیه‌ی عبارت  $x^2 + (x - 1)^2$  همواره کدام عامل زیر وجود دارد؟

$2x$  (۴)       $x + 1$  (۳)       $2x + 1$  (۲)       $2x - 1$  (۱)

-۳۱ در تجزیه‌ی عبارت  $x^4 - 3x^3 + 8x - 24$  کدام عامل ضرب وجود دارد؟

$x + 3$  (۴)       $x + 2$  (۳)       $x - 2$  (۲)       $x - 4$  (۱)

-۳۲ مقدار  $x$  در تساوی  $\sqrt[4]{x} \sqrt[3]{x} \sqrt{x} = \sqrt[8]{8}$  کدام است؟

$4$  (۴)       $\sqrt[7]{4}$  (۳)       $2$  (۲)       $\sqrt[5]{2}$  (۱)

-۳۳ حاصل  $(\sqrt{32} + \sqrt{22} - \sqrt{50})^{13}$  کدام است؟

۰ صفر (۴)      ۱ (۳)       $(\sqrt{2})^{13}$  (۲)       $(2\sqrt{2})^{13}$  (۱)

-۳۴ اگر  $x - \frac{1}{x}$  باشد، حاصل  $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$  کدام است؟

۱۰ (۴)      ۱۶ (۳)      ۱۴ (۲)      ۱۲ (۱)

-۳۵ عبارت  $6x^3 + 7x^2 + 2x$  را تجزیه نموده‌ایم. یکی از عوامل تجزیه همواره کدام است؟

$2x + 3$  (۴)       $x + 2$  (۳)       $2x - 1$  (۲)       $3x + 2$  (۱)

-۳۶ اگر  $a(a - 3)(a + 4) = 18$  باشد، مقدار  $a(a + 4)(a - 3)$  کدام می‌تواند باشد؟

۳۲ (۴)      ۲۱ (۳)      ۱۲ (۲)      -۴۵ (۱)

-۳۷ حاصل  $\sqrt[3]{32} - \frac{1}{2}\sqrt{200} + \sqrt{8}$  کدام است؟

$6\sqrt{2}$  (۴)       $7\sqrt{2}$  (۳)       $8\sqrt{2}$  (۲)       $9\sqrt{2}$  (۱)

-۳۸ در تجزیه‌ی عبارت  $2x^2 - 5x - 3$  کدام دو جمله‌ای وجود دارد؟

$2x + 1$  (۴)       $x - 1$  (۳)       $2x + 1$  (۲)       $x + 3$  (۱)

## ریاضی(۱) دوره متوسطه‌ی دوم رشته ریاضی و تجربی

۳۹- حاصل  $1002 \times 998$  را با استفاده از کدام اتحاد می‌توان به سهولت محاسبه نمود؟

$$(x + a)(x + b) \quad (4)$$

$$(a + b)(a - b) \quad (3)$$

$$(a - b)^2 \quad (2)$$

$$(a + b)^2 \quad (1)$$

۴۰- کسر  $\frac{4}{\sqrt[4]{8}}$  با کدام عدد زیر برابر است؟

$$2\sqrt[4]{4} \quad (4)$$

$$4\sqrt[4]{2} \quad (3)$$

$$\sqrt[4]{2} \quad (2)$$

$$2\sqrt[4]{2} \quad (1)$$

۴۱- در حاصل عبارت  $(2x^2 - 3x - 2)$  ضریب  $x^3$  کدام است؟

$$-12 \quad (4)$$

$$12 \quad (3)$$

$$-6 \quad (2)$$

$$6 \quad (1)$$

۴۲- عبارت  $6 - 5x - 6x^2$  بر کدام عبارت زیر بخش‌پذیر است؟

$$2x - 1 \quad (4)$$

$$3x + 2 \quad (3)$$

$$2x + 3 \quad (2)$$

$$3x - 1 \quad (1)$$

۴۳- با افزودن کدام عدد به عبارت  $4x^2 - 6x + \frac{1}{4}$  مربع یک دوجمله‌ای حاصل می‌شود؟

$$12 \quad (4)$$

$$6 \quad (3)$$

$$\frac{15}{4} \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۴۴- حاصل عبارت  $\sqrt{6} (\sqrt{2} - \sqrt{3}) + \sqrt{50} - \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$  برابر کدام است؟

$$\sqrt{12} \quad (4)$$

$$\sqrt{8} \quad (3)$$

$$\sqrt{6} \quad (2)$$

$$\sqrt{3} \quad (1)$$

۴۵- در تجزیه عبارت  $a(a - 3)(a - 4) - 12a + 36$  کدام عامل ضرب وجود ندارد؟

$$a + 2 \quad (4)$$

$$a - 2 \quad (3)$$

$$a - 3 \quad (2)$$

$$a - 6 \quad (1)$$

۴۶- حاصل عبارت  $\sqrt{2}(\sqrt{50} - \sqrt[4]{4}) + 8^{-\frac{2}{3}}$  کدام است؟

$$\frac{25}{2} \quad (4)$$

$$\frac{33}{2} \quad (3)$$

$$\frac{29}{4} \quad (2)$$

$$\frac{33}{4} \quad (1)$$

۴۷- حاصل  $\frac{4\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{300}}{\sqrt{3}}$  کدام است؟

$$4 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

-۴۸- ساده شده‌ی عبارت A کدام است؟

$$A = \frac{\sqrt[3]{24} - \sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{2}} \times \left( \sqrt{(32)^{-1}} \right)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (4)$$

$$-\sqrt{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{2} \quad (1)$$

-۴۹- کدام عامل زیر در تجزیه‌ی هر دو عبارت  $2 - 3x^2 + 12x + 2$  و  $9x^2 + 18x + 1$ ، به‌طور مشترک، وجود دارد؟

$$3x - 1 \quad (4) \qquad 3x + 1 \quad (3) \qquad 3x + 2 \quad (2) \qquad 3x - 3 \quad (1)$$

-۵۰- اگر  $B = \sqrt{27} + 5$  و  $A = (2 - \sqrt{3})(7 + 4\sqrt{3})$  باشند، حاصل ۱ کدام است؟

$$1 + \sqrt{3} \quad (4) \qquad 1 - \sqrt{3} \quad (3) \qquad 2\sqrt{3} \quad (2) \qquad \sqrt{3} \quad (1)$$

### ۵.۳ کلید تست‌های فصل سوم

۴	۳	۲	۱	- ۳۷	۴	۳	۲	۱	- ۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۸	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۴۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۵
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۶
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۴۳	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۸
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۹
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۰
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۴۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۱۱
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۲
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۴۸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۴۹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۵۰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۵
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۶
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۷
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۱۸
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۱۹
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۰
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۱
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۲
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۲۳
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۴
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۵
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۶
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۷
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۸
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۲۹
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۳۰
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۱
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۲
					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۳
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۳۴
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ۳۵
					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ۳۶