



اگرچه نیت خوبی است زیستن ...
اما خوشکه دست به تصمیم بهتری بزنیم !

www.konkursara.com

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دانلود بهترین جزوات در

کنکورسرا

کنکورسرا

مرجع تخصصی قبولی آزمون فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش


تمرين ۱: درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص کنید:	
(الف) همه گیاهان فتوسنتز می‌کنند.	
(ب) همه مواد شرکت‌کننده در غشای یاخته از طریق فتوسنتز قابل تولید است.	
(ب) هیچ گیاهی بدون ریشه قادر به جذب آب و مواد معدنی نیست.	
(ت) برگ‌ها، کربن را فقط به صورت کربن دی‌اکسید جذب می‌کنند.	
پاسخ:	
ب) درست	(الف) نادرست
ت) نادرست	پ) نادرست
تمرين ۲: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:	
(الف) عنصر اساس پروتئین است.	
(ب) کربن دی‌اکسید به صورت توسط ریشه قابل جذب است.	
ب) بی‌کربنات	پ) سایر (الف) کربن

نکته			
آب	مواد غیرآلی	عوامل غیرزنده	حک
هو	مواد آلی	عوامل زنده	سایر مواد معدنی (... Ca^{2+}, NO^{3-}, K^+)
مواد معدنی			
هوموس			O_2
بقایای تجزیه‌نشده			H_2O
جانداران			
باکتری‌ها			
قارچ‌ها			
آغازیان			
کرم‌ها و حشرات			

گرچه بیشتر گیاهان می‌توانند به وسیله فتوسنتز، بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، لیپیدها و بعضی مواد آلی دیگر را تولید کنند اما همچنان به مواد مغذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند. گیاهان، این مواد را به کمک اندامهای خود، به ویژه ریشه‌ها جذب می‌کنند. گیاهان چه سازوکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آن‌ها به اندامهای خود دارند؟ مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به سراسر گیاه منتقل می‌شوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال گیاهان می‌پردازیم.

گفتار ۱: تغذیه گیاهی

گیاهان برای رشد و نمو، به مواد مختلفی نیاز دارند. گیاهان، این مواد را از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب می‌کنند. کربن دی‌اکسید یکی از مهم‌ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می‌کنند. کربن، اساس ماده آلی و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است. این گاز به همراه سایر گازها از راه فضاهای بین یاخته‌ای به گیاه وارد می‌شود. مقداری از کربن دی‌اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت بی‌کربنات درمی‌آید که می‌تواند توسط برگ‌ها و یا ریشه جذب شود. سایر مواد مغذی هم بیشتر از طریق خاک جذب می‌شوند.




شکل ۱- عناصر مورد نیاز برای گیاه

خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

خاک، ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگان‌ها (میکرووارگانیسم‌ها) است. خاک‌های مناطق مختلف به علت تفاوت در این ترکیبات، توانایی متفاوتی در نگهداری آب، مقدار هوای خاک، pH و مواد معدنی دارد.

بخش آلی خاک یا گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیه آن‌ها تشکیل شده

است. بعضی از اجزای گیاخاک، که منشأ آن‌ها بیشتر گیاهی است، موادی اسیدی تولید می‌کنند که به علت داشتن بارهای منفی، یون‌های مثبت را در سطح خود نگه می‌دارند. این کار گیاخاک مانع از شستشوی این یون‌ها می‌شود. گیاخاک باعث نرمی بافت خاک نیز می‌شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.



قست ۱: کدام عبارت درست است؟

۱) مقدار هوای خاک وابسته به مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامکان است.

۲) بخش نگهدارنده یون‌های مثبت در هوموس مواد اسیدی‌اند که همگی منشأ گیاهی دارند.

۳) اندازهٔ ذرات رس بسیار درشت‌تر از شن بوده و جزو مواد غیرآلی خاک‌اند.

۴) هوازدگی شیمیایی همانند هوازدگی فیزیکی مستقل از عوامل زندهٔ خاک رخ می‌دهد.

پاسخ: توانایی در نگهداری آب، هوا، pH و مواد معنی خاک وابسته به مواد آلی، غیرآلی و میکروگانیسم‌هاست. گزینه «۱» درست است.

گزینه «۲»: بیشتر منشأ گیاهی دارند.

گزینه «۳»: ذرات رس ریزتر از ذرات شن‌اند.

گزینه «۴»: در هوازدگی شیمیایی

قست ۲: کدام عبارت نادرست است؟

۱) در ساختار سلیتین همانند DNA فسفر وجود دارد.

۲) آمونیوم همانند بی‌کربنات از طریق ریشه قابل جذب است.

۳) گیاهان توانایی کمی در جذب نیتروژن به شکل مولکولی دارند.

۴) آمونیوم همانند نیترات بیشتر توسعه عوامل زندهٔ خاک تولید می‌شوند.

پاسخ: اگر چه ۷۸٪ جو زمین N₂ است اما گیاهان نمی‌توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. گزینه «۳» درست است.

شکل ۲ - یون‌های منفی خاک، یون‌های مثبت را در سطح خود نگه می‌دارند.

ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ‌ها در فرایندی به نام **هوازدگی** ایجاد می‌شوند. این ذرات از اندازهٔ بسیار کوچک رس تا بسیار درشت شن و ماسه را شامل می‌شوند. تغییرات متناوب یخ‌زدن و ذوب‌شدن آب، که باعث خرد شدن سنگ‌ها می‌شود، نمونه‌ای از اثر **هوازدگی فیزیکی** است. اسیدهای تولید شده توسعه بعضی از گاندران و نیز ریشه گیاهان هم می‌توانند **هوازدگی شیمیایی** ایجاد کنند.

جذب مواد معنی در خاک

نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین‌ها و مولکول‌های وراثتی شرکت می‌کنند. گیاهان، این دو عنصر را بیشتر از خاک جذب می‌کنند.

جذب نیتروژن

با این که جو زمین دارای ۷۸٪ نیتروژن (N₂) است، گیاهان نمی‌توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت یون آمونیوم (NH₄⁺) یا نیترات است. این ترکیبات بیشتر در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می‌شوند. خلاصه‌ای از این فرایندها در شکل ۳ نشان داده شده است. به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان **تبیيت نیتروژن** گفته می‌شود. بخشی از نیتروژن تبیيت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی بعضی از باکتری‌هاست. باکتری‌های تبیيت‌کنندهٔ نیتروژن،

تمرين ۳: درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص کنید:

(الف) هر باکتری همزیست با گیاهان، توانایی ثبیت نیتروژن را دارد.

(ب) هر باکتری ثبیت کننده نیتروژن با گیاهان رابطه همزیستی دارد.

(پ) هر نیتروژن ثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی بعضی از باکتری هاست.

ت) نیتروژن های ثبیت شده توسط باکتری ها تنها پس از مرگ باکتری ها برای گیاهان قابل دسترس است.

پاسخ: (الف) نادرست (ب) نادرست (ت) نادرست (پ) نادرست

به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

نیتروژن ثبیت شده در این باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و پس از مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس می شود. مهم ترین

انواع ثبیت نیتروژن، در ادامه این فصل توضیح داده خواهد شد.


امروزه تلاش های زیادی برای انتقال ژن های مؤثر در ثبیت

نیتروژن به گیاهان در جریان است، تا بدون نیاز به این باکتری ها،

نیتروژن مورد نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد.

در شکل ۳ انواع دیگری از باکتری های خاک دیده می شوند. نقش

هر یک از آنها در تغییر و تبدیل مواد نیتروژن دار چیست؟



قست ۳: چند مورد درست است؟

- هر باکتری تولید کننده NH_4^+ ، باکتری ثبیت کننده نیتروژن است.

- تبدیل NH_4^+ به نیترات، توسط باکتری های ثبیت کننده نیتروژن صورت می گیرد.

- محصولات باکتری های ثبیت کننده نیتروژن مستقیماً توسط ریشه قابل جذب نیست.

- آمونیوم جذب توسط ریشه گیاهی از طریق آوند چوبی به بخش هوایی فرستاده می شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

پاسخ: مورد اول نادرست است، مثلاً باکتری های آمونیاک ساز مورد دوم نادرست است. باکتری ثبیت کننده N_2 را به آمونیوم تبدیل می کنند ولی تبدیل آمونیوم به نیترات توسط باکتری های نیترات ساز صورت می گیرد.

مورد سوم درست است مثل آمونیوم و مورد چهارم نادرست است.

گزینه «۱» درست است.

جذب فسفر

فسفر (P) از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، رشد گیاهان را محدود می کند. گیاهان، فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون های فسفات از خاک به دست می آورند. گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دلایل آن، این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک (مثل آهن، کلسیم و آلومینیم) به طور محکم متصل می شود. برخی گیاهان برای جبران، شبکه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتر، ایجاد می کنند که جذب را افزایش می دهد.

بهبود خاک

خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد یا فزونی مواد دیگری باشد. اصلاح این خاک ها می تواند آنها را برای گیاهان قابل کشت کند. اگر این خاک ها دچار کمبود باشند، با افزودن کود می توان حاصل خیزی آنها را افزایش داد.

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان



تمرين ۴: هر يك از عناصر زير به چه شكل يونى توسيط ريشه گياهان جذب مى شود:

- الف) فسفر
- پ) نيتروژن
- ب) كربن
- پ) نيترات يا آمونيوم
- ب) بنيات
- پ) باسخ: الف) سففات




قسمت ۴: کدام عمارت نادرست است؟

- ۱) گیاهان، فسفر را به صورت فسفات از خاک جذب می‌کنند.
 - ۲) برخی از گیاهان برای جذب فسفات سلول‌های تمایز‌یافته روپوستی فراوانی دارند.
 - ۳) فسفر به شکل یونی در خاک به مقدار اندک یافت می‌شود.
 - ۴) بعضی از ترکیبات معدنی خاک مانع از جذب بیشتر فسفات توسط گیاه می‌شود.



نوع کود	ترکیبات	مزایا	معایب
آلی	بقایای در حال تجزیه جانداران	۱- به آهستگی آزاد کردن مواطنی ۲- آسیب کمتر به گیاهان در استفاده بیش از حد آنها	احتمال آلودگی به عوامل بیماری‌زا
شیمیایی	عناصر معدنی	جبران سریع کمبود مواد مغذی خاک	۱- آسیب زیاد به خاک و محیط زیست در مصرف بیش از حد ۲- تخریب بافت خاک ۳- مرگ و میر جانوران آبزی به دلیل وارد شدن این مواد به آب‌ها توسط بارش و رشد سریع باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان آبزی
زیستی (بیولوژیکی)	باکتری	۱- شامل باکتری‌های مفیدی که موجب افزایش مواد معدنی خاک می‌شوند. ۲- استفاده ساده‌تر و کم هزینه‌تر	معایب دو نوع کود دیگر را ندارد.

زیست‌شناسان برای تشخیص نیازهای تغذیه‌ای گیاهان، آن‌ها را در محلول‌های مغذی رشد می‌دهند (شکل ۴). این محلول‌ها، آب و عناصر مغذی محلول به مقدار معین دارند. از این شیوه برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده می‌شود.



شکل ۴ - دستگاه ساده‌ای برای کشت گیاهان در محلول‌های مغذی

مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاک‌ها محدود است، به همین دلیل در بیشتر کودهای این عناصر وجود دارند. کودهای مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیک) وجود دارند.

کودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزیه جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می‌کنند و چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند، استفاده بیش از حد آن‌ها به گیاهان آسیب کمتری می‌زند. از معایب این کودهای احتمال آلوودگری به عواما سماوی نیست.

کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توانند به سرعت، کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می‌تواند آسیب‌های زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی، با شسته شدن توسط بارش‌ها، این مواد به آب‌ها وارد می‌شوند. حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری‌ها، جلیک‌ها و گیاهان آبزی می‌شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می‌شود و می‌تواند باعث مرگ و میر جانواران آبزی شود.

کودهای زیستی شامل باکتری‌هایی هستند که برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود، بعضی مواد معدنی خاک را افزایش می‌دهند. استفاده از این کودها بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. این کودها عموماً به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می‌شوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.



- قست ۵:** کودهای برخلاف کودهای
- (۱) آلی-شیمیایی، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می‌کند.
 - (۲) آلی-شیمیایی، موجب تخریب بافت خاک می‌شود.
 - (۳) شیمیایی-زیستی، استفاده آسان و کم هزینه‌تری دارد.
 - (۴) زیستی-آلی، موجب شیوع عوامل بیماری‌زا می‌شود.

پاسخ: گزینه «۱» درست است. در سایر گزینه‌ها ویژگی‌های کودها بر عکس مقایسه شده‌اند.

همان‌طور که کاهش عناصر مغذی در خاک برای گیاهان زیان‌بار است، افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک می‌تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان می‌توانند غلظت‌های زیادی از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگه‌داری کنند؛ مثلاً نوعی سرخس می‌تواند آرسنیک را که ماده‌ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

تست ۷: چند مورد درست است؟

- ۹۰٪ گیاهان دارای میکوریزا می‌باشند.
 - در میکوریزا فقط یک نوع قارچ شرکت دارد.
 - در میکوریزا ممکن نیست رشته‌های قارچ وارد سلول گیاهی شوند.
 - در میکوریزا بخشی از گیاه شرکت دارد که قادر کوتیکول می‌باشد.

١ (١) ٢ (٢) ٣ (٣) ٤ (٤) صفر

پاسخ: مورد اول نادرست است. (۹۰٪ گیاهان دانه‌دار هستند).

مورد دوم نادرست است انواعی از قارچ‌ها شرکت دارند.

مورد سوم نادرست است رشته‌های قارچ می‌توانند وارد سلول شوند.

مورد چهارم درست است ریشه فاقد کوتیکول است. گزینه «۱» درست است.

تمرين ۷: در مورد قارچ ریشه‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

- الف) کدام جاندار از این رابطه سود می‌برد؟

ب) کدام عنصر بیشتر توسط قارچ برای گیاه تأمین می‌شود؟

پ) قارچ چه موادی از گیاه می‌گیرد؟

پاسخ: الف) هر دو
ب) فسفر
ت) زیاد
پ) مواد آلی



(ب)


گفتار ۲: جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

گیاهان شیوه‌های شگفت‌انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با بعضی از این جانداران ارتباط همزیستی برقرار می‌کنند. از مهم‌ترین انواع این همزیست‌ها، فارج ریشه‌ای‌ها (میکوریزا) و باکتری‌های تثبیت‌کننده بیتروزن هستند.

قارچ ریشه‌ای

یکی از معمول‌ترین سازگاری‌ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشه‌گیاهان با انواعی از قارچ‌ها است که به آن فارج ریشه‌ای گفته می‌شود (شکل ۷). حدود ۹۰٪ گیاهان دانه‌دار با قارچ‌ها همزیستی دارند. این قارچ‌ها درون ریشه یا به صورت غلافی در سطح ریشه زندگی می‌کنند و یا با فرستادن رشته‌های ظرفی به درون ریشه، تبادل مواد را با ریشه انجام می‌دهند.

در قارچ ریشه‌ای، قارچ، مواد آلی را از ریشه گیاه می‌گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می‌کند. پیکر رشته‌ای و بسیار ظریف قارچ‌ها، نسبت به ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می‌تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند. وجود گیاهان شاداب همزیست با قارچ ریشه‌ای در خاک‌های فقیر، تا حدود زیادی به علت توانایی قارچ ریشه‌ای در جذب سریع مواد و انتقال آن به ریشه گیاه است.



به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می‌کند. ب) مقایسه دو گیاه که یکی با کمک قارچ- ریشه‌ای (چپ) و دیگری بدون آن (راست) و در وضعیت برابر محیطی، رشد کرده است.

مسئلہ ۸: ریزوپیوم سیانوباکتری

- ۱) همانند- می تواند NH_4^+ را به N_2 تبدیل کند.
- ۲) برخلاف- توانایی جذب و استفاده از انرژی را ندارد.
- ۳) همانند- فتوسنتز کننده است.
- ۴) برخلاف- با گیاهان رابطه همزیستی دارد.

پاسخ: ریزوپیوم و سیانوباکتری هر دو ثبیت کننده نیتروژن اند. گزینه «۱» درست است.

گزینه «۲»: هر موجود زنده‌ای توانایی جذب و استفاده از انرژی را دارد. (فصل ۱)

گزینه «۳»: سیانوباکتری برخلاف ریزوپیوم فتوسنتز کننده است.

گزینه «۴»: هر دو می توانند رابطه همزیستی داشته باشند.

مسئلہ ۸: درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص کنید.

الف) از گیاهان تیره پروانهواران برای تولید گازوئیل زیستی استفاده می شود.

ب) از ژن‌های ریزوپیوم می توان برای ترازنی کردن عدس استفاده کرد.

پ) لوپیا همانند یونجه توانایی ثبیت نیتروژن را دارد.


ت) به دنبال مرگ شبدر، هوموس غنی از نیتروژن ایجاد می شود.

پاسخ: الف) درست مثل سویا ب) درست
پ) نادرست گیاهان قدرت ثبیت نیتروژن ندارد. ت) درست

همزیستی گیاه با ثبیت کننده‌های نیتروژن

برخی گیاهان با انواعی از باکتری‌ها همزیستی دارند که این همزیستی برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر است. دو گروه مهم این باکتری‌ها عبارت‌اند از: ریزوپیوم و سیانوباکتری‌ها.

ریزوپیوم: از گذشته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام می‌شد که در آن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی‌درپی کشت می‌شد. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد، گیاهان تیره پروانهواران است (دلیل این نام‌گذاری، شباخت گلهای آن‌ها به پروانه است). سویا، نخود، عدس، لوپیا، شبدر و یونجه از گیاهان مهم زراعی این تیره هستند. در ریشه این گیاهان و در محل بر جستگی‌هایی به نام **گرهک**، نوعی باکتری ثبیت کننده نیتروژن به نام **ریزوپیوم گرهک**، نوعی باکتری ثبیت کننده نیتروژن به نام **ریزوپیوم زندگی می‌کند** (شکل ۸). هنگامی که این گیاهان می‌میرند یا بخش‌های هوایی آن‌ها برداشت می‌شود، گرهک‌های آن‌ها در خاک باقی می‌ماند و **گیاخاک** عنی از نیتروژن ایجاد می‌کنند. ریزوپیوم‌ها با ثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می‌کنند و **گیاه نیز مواد آلی** مورد نیاز باکتری را برای آن **فراهمن کند**.



شکل ۸- ثبیت نیتروژن توسط ریزوپیوم‌ها

همزیستی با سیانوباکتری‌ها: سیانوباکتری‌ها نوعی از باکتری‌های فتوسنتز کننده هستند که بعضی از آن‌ها می‌توانند علاوه بر فتوسنتز، ثبیت نیتروژن هم انجام دهند. آزو لا گیاهی کوچک است که در تالاب‌های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد. گیاه آزو لا با سیانوباکتری‌ها همزیستی دارد و نیتروژن ثبیت شده آن را دریافت می‌کند (شکل ۹). بعضی از گیاهان مانند گونرا نیز (شکل ۹) در نواحی فقری از نیتروژن رشد شگفت‌انگیزی نشان می‌دهند. چگونه این گیاهان با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارند؟ سیانوباکتری‌های همزیست درون ساقه و دمبرگ این گیاه، ثبیت نیتروژن انجام می‌دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می‌کنند.

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان



قست ۹: کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) گونرا همانند باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن همزیست خود، فتوسنتر دارد.
 - ۲) آزولا همانند باکتری تثبیت‌کننده نیتروژن همزیست خود، فتوسنتر دارد.
 - ۳) باکتری‌های درون گرهک‌های گیاه نخود نیاز گیاه را به نیتروژن برطرف می‌کنند.
 - ۴) بخش‌های هوایی گیاه تیره پروانه‌واران فاقد NH_4^+ است.
- پاسخ:** آمونیومی که توسط باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن دارد، ریشه گیاهان تیره پروانه‌واران می‌شود از طریق ریشه به بخش‌ها وارد می‌شود. گزینه «۴» درست است.



تمرین ۹: جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید.

- الف) استفاده از کود (شیمیایی - آلی) رشد آزولا زیاد می‌شود.
- ب) آزولا گیاه بومی ایران (است - نیست)
- پ) در (ساقه - ریشه) گونرا، NH_4^+ به N_2 تبدیل می‌شود.
- ت) در (پهنک - دمبرگ) گونرا، باکتری‌های فتوسنتر کننده وجود دارند.
- ث) هر یاخته فتوسنتر کننده در برگ گیاه گونرا (سبزینه - سبزدیسه) دارد.

پاسخ:

- الف) شیمیایی
ب) نیست
پ) ساقه
ت) دمبرگ
ث) سبزینه



شکل ۹ - بالا) گیاه آبزی آزولا، بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تالاب‌های شمالی وارد شد. رشد سریع این گیاه موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری آبزیان می‌شود. این گیاه اکنون به معرضی برای این تالاب‌ها بدل شده است.

پایین) سیانوباکتری‌هایی که در حفره‌های کوچک شاخه و دمبرگ این گیاه زندگی می‌کنند، نیتروژن تثبیت شده را برای گیاه فراهم می‌کنند. علت بزرگ بودن گیاه و برگ‌های آن در این مناطق غیرحاصل خیز، همزیستی با این باکتری‌هاست.

روش‌های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان

گیاهان گوشت خوار: این گیاهان فتوسنتر کننده‌اند، ولی در مناطقی زندگی می‌کنند که از نظر بعضی مواد مانند نیتروژن فقیرند. در این گیاهان برخی برگ‌ها برای شکار و گوارش



قست ۱۰: در هر گیاه گوشتخواری

- ۱) هر برگی برای شکار و گوارش جانوران کوچک، تغییر کرده است.
 - ۲) بخش کوزه‌مانندی به وجود می‌آید که حشرات را به درون خود می‌کشد.
 - ۳) سبزدیسه‌ها می‌توانند به کرومپلاست تبدیل شوند.
 - ۴) تبدیل NH_4^+ به N_2 توسط باکتری‌ها صورت می‌گیرد.
- پاسخ:** گیاهان گوشتخوار فتوسنترکننده‌اند لذا سبزدیسه دارند که می‌توانند به کرومپلاست تبدیل شوند. گزینه «۳» درست است.



قست ۱۱: هر گیاه انگلی

- ۱) برای کسب مواد آلتی نیاز به یک میزان دارد.
- ۲) همه مواد غذایی خود را از میزان تهیه می‌کند.
- ۳) دارای میزانی با یاخته‌های دارای سبزینه است.
- ۴) قادر توانایی فتوسنتر است.

پاسخ: گیاهان انگل می‌توانند فتوسنترکننده یا غیر فتوسنتر کننده باشند اما از گیاهان فتوسنترکننده تعذیه می‌کنند. گزینه «۳» درست است.

جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. گیاه توبرهواش که در نالاب‌های شمال کشور هست نیز به روش مشابهی حشرات و لاروی آن‌ها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می‌کشد و سپس گوارش می‌دهد. در شکل ۱۱، انواع دیگری از گیاهان حشره‌خوار نشان داده شده است.



شکل ۱۰- گیاه توبرهواش



گیاهان انگل: انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنترکننده دریافت می‌کنند. گیاه سس، نمونه‌ای از این گیاهان است. این گیاه ساقه نارنجی یا زرد رنگی تولید می‌کند که قادر ریشه است. گیاه سس به دور گیاه سبز میزان خود می‌پیچد و بخش‌های مکنده ایجاد می‌کند (شکل ۱۲ - الف) که به درون دستگاه آوندی گیاه نفوذ، و مواد مورد نیاز انگل را جذب

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

تست ۱۲: چند مورد صحیح است؟

- گل جالیز مواد مغذی خود را از ساقه گیاه گوجه‌فرنگی تأمین می‌کند.
- گیاه سس دارای رنگ مشابه کاروتون یا گزان توفیل است.
- گیاه سس همانند گل جالیز فاقد ریشه است.
- گیاه سس از سامانه بافتی تغذیه می‌کند که دارای یاخته‌های نرم‌آکنه است.


۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

پاسخ: مورد اول نادرست است از ریشه تغذیه می‌کند.
مورد دوم درست است.

مورد سوم نادرست است گیاه سس فاقد ریشه است.
مورد چهارم درست است بافت آوندی دارای سلول‌های پارانشیمی است. گزینه «۲» درست است.

تست ۱۳: گیاه توپرهاش گیاه گل جالیز است. (آزمون مدارس برتر) (۱) همانند- انگل (۲) برخلاف- دارای سبزدیسه (۳) برخلاف- دارای ریشه (۴) همانند- فاقد محل‌های منبع


پاسخ:



می‌کند. گل جالیز نمونه دیگری از این گیاهان است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می‌کند (شکل ۱۲- ب)



شکل ۱۲- گیاهان انگل: (الف) گیاه سس (ب) گیاه گل جالیز



Xie X, et al. 2010.
Annu. Rev. Phytopathol. 48:93–117


شکل ۱۳- چرخه زندگی گیاه گل جالیز

گفتار ۳: انتقال مواد در گیاهان

انتقال از خاک به برگ

آب و مواد موردنیاز گیاهان، اغلب از خاک اطراف ریشه‌ها جذب می‌شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ می‌رود. بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ‌ها به هوا تبخیر می‌شود. خروج آب از سطح اندام‌های هوایی گیاه **تعرق** نامیده می‌شود. تعرق، سازوکار لازم را برای جایه‌جایی آب و مواد معده‌ی به برگ فراهم می‌کند. جایه‌جایی مواد در گیاهان را می‌توان در دو مسیر کوتاه و بلند بررسی کرد؛ **در مسیر کوتاه**، جایه‌جایی آب و مواد در سطح یاخته‌ی یا چند یاخته بررسی می‌شود. **در مسیر بلند**، جایه‌جایی مواد در مسیرهای طولانی‌تر بررسی می‌شود. این مسافت در بعضی درختان به بیش از صد متر می‌رسد. در هر دوی این مسیرها آب به عنوان انتقال دهنده مواد، نقش اساسی دارد که این نقش به علت ویژگی‌های آن است. **پتانسیل آب**، عامل اصلی در حرکت آب است.





شکل ۱۴- نشان دهنده تغییرات پتانسیل آب در خاک، گیاه و هوای اطراف آن است.

پتانسیل آب(سای = Ψ): می دانید که انرژی پتانسیل، انرژی ذخیره شده در ماده یا سامانه یا توانایی انجام کار است. آب نیز دارای انرژی پتانسیل است و از محل دارای انرژی پتانسیل بالاتر به ناحیه‌ای با انرژی پتانسیل کمتر حرکت می کند. بنابراین پتانسیل آب، تعیین کننده جهت حرکت آب و مواد حل شده در آن است. یکی از عوامل مهم مؤثر بر پتانسیل آب، غلظت مواد حل شده است. پتانسیل آب خالص، صفر است و وقتی ماده‌ای در آن حل می شود پتانسیل آب کاهش می یابد. بنابراین غلظت مواد محلول در آب بر پتانسیل آن مؤثر است.

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان


جابه‌جایی مواد در مسیر کوتاه

تست ۱۴: با توجه به شیوه‌های انتقال مواد در مسیر کوتاه از عرض ریشه یک گیاه علفی فقط در مسیر انتقال است که (آزمون مدارس برتر)

- ۱) آپوپلاستی- آب و مواد محلول می‌توانند از فضای بیرون پروتوبلاست عبور کنند.
- ۲) سیمپلاستی- آب و همه مواد محلول می‌توانند از فضای پلاسمودسم به یاخته‌های دیگر منتقل شوند.
- ۳) عرض غشا- آب می‌تواند از آکواپورین‌ها برای عبور استفاده کند.
- ۴) سیمپلاستی- نوار کاسپاری نمی‌تواند مانع انتقال آب و مواد محلول آن شود.


پاسخ:

انتقال مواد در سطح یاخته‌ای: در این حالت، جابه‌جایی مواد با فرایندهای **فعال** و **غیرفعال** و در حد یاخته انجام می‌شود. با این فرایندها در فصل‌های گذشته آشنا شدید. شیوه‌هایی مثل انتشار و انتقال فعال، نمونه‌هایی از این روش‌هاست. آب یکی از مواد مهم برای جانداران است. برای انتقال آب در عرض غشای بعضی یاخته‌های گیاهی و جانوری و غشای کریچه بعضی یاخته‌های گیاهی، کانال‌های پروتئینی به نام **آکواپورین** هست که به سرعت جریان آب را به درون یاخته و گریچه افزایش می‌دهند. **هنگام کم‌آبی**، ساخت این پروتئین‌ها تشدید می‌شود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- پروتئین تسهیل‌کننده عبور آب (آکواپورین) در غشا

انتقال مواد در عرض ریشه: در عرض ریشه، انتقال آب و مواد محلول معدنی به سه روش انجام می‌شود؛ انتقال از **عرض غشا**. انتقال سیمپلاستی و انتقال آپوپلاستی.




شکل ۱۶- شیوه‌های انتقال مواد در مسیر کوتاه

انتقال عرض غشای شامل جابه‌جایی مواد از **عرض غشا** یاخته است. سیمپلاست به معنی **پروتوبلاست همراه پلاسمودسم‌ها** است. انتقال سیمپلاستی حرکت مواد از پروتوبلاست یک یاخته به یاخته مجاور، از راه پلاسمودسم‌هاست.

- تست ۱۵:** برای عبور آب در عرض ریشه، در مسیر آپوپلاستی مسیر عرض غشا (آزمون مدارس برتر)
- ۱) برخلاف- هیچ یک از اجزای یاخته دخالتی ندارند.
 - ۲) همانند- پتانسیل آب در جهت حرکت آب نقش تعیین‌کننده دارد.
 - ۳) برخلاف- پلاسمودسم‌ها شرکت دارند.
 - ۴) همانند- آکواپورین‌ها دخالت دارند.
- پاسخ:**

آب و بسیاری از مواد محلول می‌تواند از فضای پلاسمودسم به یاخته‌های دیگر منتقل شود (شکل ۱۶). منافذ پلاسمودسم آنقدر بزرگ است که پروتئین‌ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس‌های گیاهی از آن عبور می‌کند. در مسیر آپوپلاستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته‌ای و نیز دیواره‌یاخته‌ای انجام می‌شود.

آب و مواد محلول در عرض ریشه معمولاً به روش آپوپلاستی و سیمپلاستی انتقال می‌یابد. در این مسیر، حرکت آب و مواد محلول، از روپوست تا درونی‌ترین لایه پوست به نام درون‌پوست (آنودردم) انجام می‌گیرد. درون‌پوست استوانه‌ای ظرفی از یاخته



- تست ۱۶:** کدام عبارت، درباره بیرونی‌ترین یاخته‌های استوانه مرکزی ریشه یک گیاه دولپه‌ای نادرست است؟
- ۱) در مجاورت سامانه بافت زمینه‌ای قرار دارند.
 - ۲) می‌توانند آب و املال را در مسیر سیمپلاستی عبور دهند.
 - ۳) یون‌های محلول در آب، توسط آن‌ها به آوندهای چوبی تراویری می‌شود.
 - ۴) به قطورترین آوندهای چوبی نسبت به آوندهای چوبی باریک، نزدیک‌تر هستند.
- پاسخ:**

شکل ۱۷- مسیر آپوپلاستی و سیمپلاستی در گیاهان: نوار کاسپاری درون پوست، مانع انتقال آپوپلاستی از درون آوند چوبی می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود جایه‌جایی مواد در بخشی از مسیر می‌تواند آپوپلاستی و سیمپلاستی مواد باشد.


فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

-  **تست ۱۷:** کدام عبارت، درباره ریشه یک گیاه علفی دولپه است؟ (آزمون مدارس برتر)
- ۱) مولکول‌های آب فقط از طریق دیوارهای یاخته و فضاهای بین یاخته‌ای حرکت می‌کنند.
 - ۲) سرداد نوک ریشه فقط در تشکیل روپوست، بافت‌های زمینه‌ای و کلاهک نقش دارد.
 - ۳) در استوانه مرکزی گروهی از یاخته‌ها در دیواره جانبی خود دارای نواری از جنس سوبرین هستند.
 - ۴) استوانه‌ای ظرفی از یاخته‌ها سدی را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد می‌کنند.
- پاسخ:**

مانع از ورود ناخواسته یا مضر مسیر آپوپلاستی
مانع از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه
کنترل ورود آب و بون‌ها

نقش نوار کاسپاری

درون‌پوست در دیواره جانبی خود دارای نواری از جنس **چوب پنبه (سوبرین)** هستند که به آن **نوار کاسپاری** گفته می‌شود. بنابراین آب و مواد محلول آن **فقط** می‌توانند از درون یاخته‌های درون‌پوست به استوانه آوندی منتقل شوند. در این حالت یاخته‌های درون‌پوست انتقال مواد را **کنترل می‌کنند**. این لایه در ریشه **مانند صافی‌هایی** عمل می‌کند که مانع از ورود مواد ناخواسته یا **مضر مسیر آپوپلاستی** به درون گیاه می‌شوند. درون‌پوست، همچنین از **برگشت مواد** جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری می‌کند. حرکت در هر دو مسیر در لایه ریشه‌زا ادامه می‌یابد و در آخر، مواد طی فرایندی به نام **بارگیری چوبی**، به آوندهای چوبی منتقل و آماده جایه‌جایی برای مسیرهای طولانی‌تر می‌شوند.



شکل ۱۸- نوار کاسپاری

در ریشه بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری علاوه بر دیوارهای جانبی درون‌پوست، دیواره پشتی را نیز می‌پوشاند و انتقال مواد از این یاخته‌ها را **غیرممکن** می‌کند. در پرش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری این یاخته‌ها ظاهر نعلی یا ل شکل دارند (شکل ۱۹). در این گیاهان بعضی از یاخته‌های درون‌پوستی ویژه، به نام **یاخته معبر** هست که قادر نوار کاسپاری در اطراف خود هستند و انتقال مواد به استوانه آوندی از طریق این یاخته‌ها انجام می‌شود.


تست ۱۸: یاخته‌های معتبر جزو یاخته‌های اند و

..... نوار کاسپاری می‌باشند. (آزمون مدارس برتر)

(۱) استوانه مرکزی - دارای (۲) پوست - فاقد

(۳) استوانه مرکزی - فاقد (۴) پوست - دارای

پاسخ:



شکل ۱۹- تصویر میکروسکوپی مقطع عرضی ریشه نوعی گیاه.

یاخته‌های معتبر با پیکان نشان داده شده‌اند. یاخته‌های درون پوست

در این ریشه‌ها به صورت نعلی شکل (U) دیده می‌شود.

تست ۱۹: کدام عبارت در ارتباط با لایه‌ای که مانند

صفی در ریشه نهاندانگان عمل می‌کند، صحیح است؟ (آزمون مدارس برتر)

(۱) جزو خارجی ترین لایه استوانه آوندی است.

(۲) می‌تواند منشأ ریشه‌های فرعی باشد.

(۳) می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جریان توده‌ای باشد.

(۴) قطعاً در دیواره جانبی همه یاخته‌های آن سوبرین یافت می‌شود.

پاسخ:



انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

شیره خام در گیاهان، گاه تا فواصل بسیار طولانی جابه‌جا می‌شود. انتشار و انتشار تسهیل شده برای فواصل طولانی، کارآمد نیست. در گیاهان، جابه‌جایی مواد در مسیرهای طولانی توسط جریان توده‌ای انجام می‌شود. جریان توده‌ای حرکت گروهی مواد از جایی با فشار زیادتر به جایی با فشار کمتر است. سرعت انتشار آب و مواد در گیاه، چند میلی‌متر در روز است ولی در جریان توده‌ای، این سرعت به چندین متر در روز می‌رسد. جریان توده‌ای در آوندهای چوبی تحت اثر دو عامل فشار ریشه‌ای و تعرق، و با همراهی خواص ویژه آب انجام می‌شود.

الگوی جریان توده‌ای در شیره‌ی خام درون آوند چوبی } فشار ریشه‌ای
الگوی جریان فشاری شیره‌ی بروزده درون آوند آبکشی } انتقال مواد در مسیر بلند

فشار ریشه‌ای: یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده درون استوانه آوندی ریشه، با انتقال فعال، یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می‌کنند. این عمل باعث افزایش مقدار آین یون‌ها، کاهش پتانسیل آب و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی می‌شود. در اثر تجمع آب و یون‌ها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می‌یابد و فشار ریشه‌ای را ایجاد می‌کند. فشار ریشه‌ای باعث هل دادن شیره خام به سمت بالا می‌شود (شکل ۲۰). در بیش‌تر گیاهان، فشار ریشه‌ای در صعود شیره خام نقش کمی دارد و در بهترین حالت می‌تواند چند متر آن را به بالا بفرستد. پس چه عاملی باعث حرکت شیره خام به نوک درختان بسیار بلند می‌شود؟




شکل ۲۰- آزمایشی برای اندازه گیری فشار ریشه‌ای

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان

- تست ۲۰:** به طور معمول، در کدام شرایط مولکول‌های آب از طریق روزنده‌های موجود در حاشیه برگ گیاه گوجه‌فرنگی دفع می‌شود؟ (آزمون مدارس برتر)
- ۱) افزایش مکش تعرقی و دور شدن یاخته‌های نگهبان روزنده‌ها از یکدیگر
 - ۲) کاهش فشار ریشه‌ای و نزدیک شدن یاخته‌های نگهبان روزنده‌ها به یکدیگر
 - ۳) پمپ کردن یون‌های معدنی به درون استوانه آوندی توسط یاخته‌های درون پوست و کاهش میزان رطوبت هوا
 - ۴) بالا رفتن فشار آب در داخل نایدیس‌ها و اشباع بودن اتمسفر

پاسخ:

تعرق: عامل اصلی: عامل اصلی انتقال شیره خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می‌شود. تعرق، خروج آب به صورت بخار از سطح بخش‌های هوایی گیاهان است. علت تعرق نیز حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیشتر به کمتر است. ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی‌های هم‌چسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب است (شکل ۲۱).



- تست ۲۱:** عامل اصلی انتقال شیره خام (آزمون مدارس برتر)
- ۱) به دنبال بسته شدن روزنۀ هوایی کاملاً متوقف می‌شود.
 - ۲) در شرایطی می‌تواند موجب کاهش قطر تنۀ درخت است.
 - ۳) می‌تواند سبب باز شدن روزنۀ آبی در انتهای برگ گیاه گندم شود.
 - ۴) با جایگزینی پیراپوست به جای روپوست غیرممکن می‌شود.

پاسخ:

شکل ۲۱ - حرکت شیره خام، تحت تأثیر مکش تعرقی و پتانسیل آب



مسئله ۲۲: برای باز شدن روزنۀ هوایی، یون‌های کلر یون‌های پتاسیم شیب غلظت، وارد یاخته‌های نگهبان روزنۀ می‌شود. (آزمون مدارس برتر)

(۱) همانند- برخلاف (۲) همانند- در جهت
 (۳) برخلاف- برخلاف (۴) برخلاف- در جهت


پاسخ:

بیشتر تعرق گیاهان از روزنۀ های برگ انجام می‌شود. نیروی مکش تعرق آنقدر زیاد است که در یک روز گرم می‌تواند باعث کاهش قطر تنّه یک درخت شود؛ هر چند این کاهش اندک است. اگر دیواره آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به راحتی در اثر مکش تعرق، له می‌شد.

تعرق در گیاهان از چه بخش‌هایی انجام می‌شود؟

در گیاهان، تعرق می‌تواند از طریق روزنۀ های هوایی، پوستک و عدسکها انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ‌ها از متفذ بین یاخته‌های نگهبان روزنۀ هوایی انجام می‌شود.

روزنۀ های هوایی می‌توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظیم کنند. باز و بسته شدن روزنۀ به دلیل ساختار خاص یاخته‌های نگهبان روزنۀ و تغییر فشار تورژسانس آن‌ها است. جذب آب به دنیال انباشت مواد محلول در یاخته‌های نگهبان روزنۀ انجام می‌شود. عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه (مانند بعضی هورمون‌های گیاهی)، با باز و بسته شدن روزنۀ ها را تنظیم می‌کنند. این عوامل با تحریک انباشت فعلی بعضی یون‌ها و ساکارز در یاخته نگهبان، پتانسیل آب یاخته‌ها را کاهش داده و آب از یاخته‌های مجاور به یاخته‌های نگهبان روزنۀ وارد می‌شود. در نتیجه، یاخته‌ها دچار تورژسانس شده و به علت ساختار ویژه آن‌ها، روزنۀ باز می‌شود. بسته شدن روزنۀ ها، در فرایندی معکوس انجام می‌شود (شکل ۲۲).



شکل ۲۲- چگونگی باز و بسته شدن روزنۀ های هوایی.
 یاخته‌های نگهبان روزنۀ با انتقال فعلی یون‌های مانند پتاسیم و کلر، پتانسیل آب را درون خود کاهش می‌دهند. این کار باعث جذب آب شده و با تورم یاخته‌ها، روزنۀ باز می‌شود.

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان



- تست ۲۲:** کدام عبارت در ارتباط با گیاه تره نادرست است؟ (آزمون مدارس برتر)
- ۱) با کاهش یون‌های پتانسیم و کلر در یاخته‌های نگهبان روزنے، تعرق کاهش می‌یابد.
 - ۲) با پلاسمولیز یاخته‌های نگهبان روزنے هوایی، یاخته‌های روپوستی مجاور دچار تورژسانس می‌شوند.
 - ۳) ویژگی‌های هم‌چسبی و دگرچسبی آب باعث می‌شود ستون آب به صورت پیوسته از راه پلاسمودسм نایدیس‌ها بالا رود.
 - ۴) به دنبال کاهش فشار ریشه‌ای و افزایش انباشت ساکارز در یاخته‌های نگهبان، کم یا متوقف می‌شود.

پاسخ:




- تست ۲۳:** کدام عبارت، درباره همه روزننهای موجود در برگ گیاهان علفی تک‌لپه و دولپه درست است؟ (آزمون مدارس برتر)
- ۱) باعث انجام تبادلات گازی گیاه با محیط خارج می‌شوند.
 - ۲) باعث حفظ جریان توده‌ای در آوندهای چوبی می‌شوند.
 - ۳) با قرار گرفتن در موقعیت‌های گرم و خشک بسته می‌شوند.
 - ۴) در پی تغییر فشار آب در یاخته‌های نگهبان، تغییر اندازه می‌دهند.

پاسخ:



ساختار یاخته‌های نگهبان روزنے: دیواره یاخته‌های نگهبان روزنے، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می‌کنند. یکی از این عوامل، آرایش شعاعی رشته‌های سلولزی است که مانند کمریندی دور دیواره یاخته‌های نگهبان روزنے قرار دارند. این کمریندۀای سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته، مانع از گسترش عرضی یاخته شده، ولی مانع افزایش طول یاخته نمی‌شوند. عامل دیگر، ضخامت بیشتر دیواره یاخته‌های نگهبان روزنے در محل تماس دو یاخته است. هنگام تورژسانس، به علت ضخامت بیشتر در بخش شکمی این دیواره، دیواره پشتی یاخته بیشتر منبسط می‌شود. این دو ویژگی باعث می‌شود هنگام جذب آب و تورژسانس، یاخته‌ها خمیدگی پیدا کند و منفذ روزنۀ هوایی باز شود. در این حالت امکان تبدال گازها، فراهم می‌شود (شکل ۲۳).



شکل ۲۳- آرایش شعاعی رشته‌های سلولزی

عوامل محیطی مؤثر بر باز و بسته شدن روزننهای گیاهان

در گیاهان، تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی‌اکسید از مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزننهای هوایی است. مقدار آب گیاه و نیز هورمون‌های گیاهی، از عوامل درونی مهم هستند. افزایش مقدار نور، دما، کاهش کربن دی‌اکسید، تا حدی معین، می‌تواند باعث باز شدن روزننهای در گیاهان شود. رفتار روزننهای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس‌ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می‌شود در طول روز، روزننهای بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. کاهش تعداد روزننهای فرو رفته، پوشیده شدن برگ از کرک‌ها و کاهش تعداد یا سطح برگ‌ها نیز از دیگر سازگاری‌های گیاهان برای زندگی در محیط‌های خشک هستند.

تسنیت ۲۴: کدام عبارت، درباره همه روزنامه‌های موجود در برگ گیاه گوجه‌فرنگی درست است؟

(۹۵) سراسری

- (۱) باعث انجام تبادلات گازی گیاه با محیط خارج می‌شوند.
 - (۲) پیوستگی شیره خام را در آوندهای چوبی حفظ می‌کنند.
 - (۳) با قرار گرفتن در موقعیت‌های گرم و خشک بسته می‌شوند.
 - (۴) در پی تغییر فشار آب در سلول‌های نگهبان، تغییر اندازه می‌دهند.

یاسخ:

قسمت ۲۵: به طور معمول، در کدام شرایط
اگر نیاز آید، میتوانیم از

برگ گیاه گوجه‌فرنگی دفع می‌شود؟ (سراسری ۹۶)

۱) افزایش کشش تعریقی و دور شدن سلول‌های نگهبان روزنه‌ها از بکدیگ.

- ۲) کاهش فشار ریشه‌ای و نزدیک شدن سلول‌های نگهبان روزنه‌ها به یکدیگر..
 - ۳) زیاد شدن فشار اسمزی در سلول‌های تارکشند و کاهش میزان رطوبت هوا
 - ۴) بالا رفتن فشار آب در داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر

پاسخ:

تست ۲۶: کدام شرایط، مولکول‌های آب به صورت
مایع از طیه منتهای محمد دانندگان، گام

(የፋይናትና ማኅበርና ተስፋዬ) ከፋይናትና ማኅበርና ተስፋዬ

- ۱) افزایش خروج بخار آب از برگ‌ها و افزایش میزان جذب آن توسط ریشه
 - ۲) بالا رفتن سرعت جذب آب در سلول‌های تارکشند و اشبعای بودن بخار آب در اتمسفر
 - ۳) نزدیک شدن سلول‌های نگهبان روزندهای هوایی به یکدیگر و کاهش یافتن فشار ریشه ای
 - ۴) زیادتر شدن تعایل گازهای محلول به خروج از شیره خام و افزایش، وارد بخار آب به اتمسفر

تعريف

در هنگام شب یا در هوای بسیار مربوط که شدت تعرق کاهش می‌یابد، یاخته‌های درون پوست هم چنان به پمپ کردن یون‌های معدنی به درون استوانه آوندی ادامه می‌دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه‌ای به برگ‌ها می‌رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتهای یا لبه برگ‌های بعضی گیاهان علفی خارج می‌شود که به آن **تعريق** می‌گویند (شکل ۲۴). اگر چه شرایط محیطی ایجاد کننده تعريق مشابه شرایط ایجاد شبیم است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت. تعريق از ساختارهای ویژه‌ای به نام **روزنده‌های آبی** انجام می‌شود و نشانه فشار ریشه‌ای است. این روزنده‌ها همیشه باز هستند و محل آن‌ها در انتهای یا لبه برگ‌هاست.



شکل ۲۴- تعریق در گیاهان


حرکت شیرہ پروردہ

می دانید که شیره پرورده، درون آوندهای آبکشی حرکت می کند.
حرکت شیره پرورده در همه جهات می تواند انجام شود. بخشی از
گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر گیاه را تأمین
می کند، محل منبع و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آن جا
می روند و ذخیره می شوند، محل مصرف نامیده می شود. برگ ها از
مهم ترین محل های منبع هستند. بخش های ذخیره کننده مواد
آلی، هنگام ذخیره این مواد، محل مصرف و

فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان


- قست ۲۷:** کدام عبارت، درباره ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیره پرورده یک گیاه نهان دانه درست است؟
- ۱) با صرف انرژی و طی فرایندی به نام باربرداری آبکشی، از منبع وارد یاخته‌های آبکشی می‌شوند.
 - ۲) همواره با سرعان معادل جریان توده‌ای در عناصر آوندی حرکت می‌کنند.
 - ۳) از طریق یاخته‌های زنده و غیرزنده در جهات مختلف جابه‌جا می‌شوند.
 - ۴) ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتری‌های غیرفتوستزکننده تولید شده باشند.
- پاسخ:**

هنگام آزادسازی آن، محل منبع به شمار می‌آیند. حرکت ترکیبات آلی درون گیاه از محل منبع به محل مصرف، **جابه‌جایی** نام دارد. برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده می‌توان از شته‌ها استفاده کرد (شکل ۱۹).



شکل ۲۵ - محل‌های منبع و مصرف در گیاه

- قست ۲۸:** طبق مدل مونش به دنبال قطعاً
- ۱) بارگیری آبکشی - پتانسیل آب آوند آبکشی افزایش می‌یابد.
 - ۲) باربرداری آبکشی - آب از آوند آبکشی خارج می‌شود.
 - ۳) افزایش فشار داخل یاخته‌های آبکشی - قندها از محل‌های ذخیره خارج می‌شوند.
 - ۴) صدور ترکیبات آلی از محل‌های منبع به محل‌های مصرف - بخش‌های مصرف رشد می‌کنند.
- پاسخ:**



شکل ۲۶ - استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده

- قست ۲۹:** جریان توده‌ای در آوندهای آبکشی (آزمون مدارس برتر)
- جریان توده‌ای در آوندهای آبکشی چوبی
- ۱) همانند - می‌تواند تحت تأثیر انتقال فعال باشد.
 - ۲) برخلاف - سریع‌تر و پیچیده‌تر است.
 - ۳) همانند - از طریق میان یاخته‌ها صورت می‌گیرد.
 - ۴) برخلاف - باعث جابه‌جایی مواد در مسیرهای طولانی می‌شود.
- پاسخ:**

چگونگی حرکت شیره پرورده: حرکت شیره پرورده از طریق میان یاخته (سیتوپلاسم) یاخته‌های زنده آبکشی و از یاخته دیگر انجام می‌شود. بنابراین حرکت شیره پرورده از شیره خام کندر و پیچیده‌تر است. یک گیاه‌شناس آلمانی به نام ارنست مونش، الگوی **جریان فشاری** را برای جابه‌جایی شیره پرورده، ارائه داده است که در شکل ۲۷ به طور خلاصه مشاهده می‌کنید.


مواد آلی در گیاهان به صورت **تنظیم شده**، **تولید** و **مصرف** می‌شوند. برای مثال در گل‌دهی یا تولید میوه، گاهی تعداد محل‌های مصرف، بیشتر از آن است که محل‌های منبع بتوانند مواد غذایی آن‌ها را فراهم کنند. در این موارد ممکن است گیاه به حذف بعضی گل‌ها، دانه‌ها یا میوه‌های خود اقدام کند تا

QUEST ۳۰ : طبق الگوی ارائه شده توسط ارنست مونش در مرحله مرحله (آزمون مدارس برتر)

- (۱) همانند-۴، انرژی مصرف می‌شود.
- (۲) همانند-۳، انرژی مصرف نمی‌شود.
- (۳) برعکاف-۳، انرژی مصرف نمی‌شود.
- (۴) برعکاف-۴، انرژی مصرف می‌شود.

پاسخ:


مقدار کافی مواد قندی به محلهای مصرف باقی‌مانده برسد. در باغبانی، برای داشتن میوه‌های درشت‌تر، تعدادی از گل‌ها یا میوه‌های جوان را می‌چینند تا درختان میوه‌هایی کمتر ولی درشت‌تر به بار آورند.



QUEST ۳۱ : از طرح مقابل کدام مورد نتیجه‌گیری نمی‌شود؟ (آزمون مدارس برتر)

-
- (۱) آوندهای آبکشی در پوست قرار دارند.
 - (۲) شیره پرورده فقط در آوند آبکشی و نه در آوند چوبی جریان دارد.
 - (۳) حرکت شیره خام کندر و پیچیده‌تر است.
 - (۴) مواد آلی می‌توانند در آوند آبکشی جمع شوند.
- پاسخ:**

شکل ۲۷- چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش



شکل ۲۱- طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیره پرورده. نورم در بالای حلقه نشان می‌دهد که شیره پرورده فقط در آوند آبکش و نه در آوند چوبی (بخش باقی‌مانده در تنه) جریان دارد.